

				Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка				
			60-100 мл/дка	Ечемик, Овес Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>); Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30 – 61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж:видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка				
2.	АЗАКА ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 01497–ПРЗ-2/19.05.2022 г. Заповед № РД 11-1768/21.08.2017 г. Заповед №РД 11-899 от 12.05.2022 г.	азоксистробин – 250 г/л	100 мл/дка	Пшеница, Тритикале Ръжди (<i>Puccinia recondite</i> , <i>P. striiformis</i>), Хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium sativum</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)		35 дни	непрофесионална	
			100 мл/дка	Ечемик Ръжди (<i>Puccinia</i> spp.), Хелминтоспориоза (<i>Pyrenophora teres</i>), Листен пригор (ринхоспориоза) (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-59 (първи възел е поне 1 см над възела на братене - край на изкласяването)		35 дни		
			100 мл/дка	Ръж Ръжда (<i>Puccinia dispersa</i>), Листен пригор (ринхоспориоза) (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)		35 дни		
			80 мл/дка	Домати Мана (<i>Phytophthora infestans</i>), брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>), кафяви петна (<i>Alternaria</i> spp.) – внася се във фаза ВВСН 20-89 (10 или повече листа на главното стъбло-пълна зрялост)		3 дни		

			100 мл/дка	Брюкселско зеле Черни листни петна (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>) – внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече разтворени същински листа-достигнат е типичния размер на главата)		14 дни		
			100 мл/дка	Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен) Склеротиниоза (бяло гниене) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Гъбни заболявания по шушулките (<i>Alternaria brassicae</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)		21 дни		
			80 мл/дка	Пъпеш Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), алтернариоза (<i>Alternaria cucumerina</i>) – внася се във фаза ВВСН 20-89 (20 листа напълно разтворени-пълна зрялост (плодовете са с типичен цвят)		3 дни		
			100 мл/дка	Семеprонзвеждащи растения (стерично-маслени, ароматни, лекарствени култури и подправки), цветя и посадъчен материал, *Трет.надз.части Болести по листата (мана, брашнеста мана,ръжда, бяла ръжда) – внася се във фаза ВВСН 20-89		-		
3.	АЗОГАРД АЗТ 250 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01592-ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед №РД 11-1045/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-500 от 11.03.2021 г.	азоксистробин - 250 г/л	60-80 мл/дка	Пшеница Срецу Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	35 дни	непрофесионална	Да се спазва закона за пчеларството