

			70-100 мл продукт/дка	Царевича Срещу Житни плевели: нискостъблен дараджан (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Широколистни плевели: просфорник, абутилон (<i>Abutilon theophrasti</i>), прасковелистно пипериче (<i>Polygonum persicaria/ Persicaria maculosa</i>), дива ряпа (<i>Raphanus raphanistrum</i>), черно куче грозде (<i>Solanum nigrum</i>), обикновен щир (<i>Amaranthus retroflexus</i>), бяла куча лобода (<i>Chenopodium album</i>), тученица (<i>Portulaca oleracea</i>), полска поветица (<i>Convolvulus arvensis</i>), пача трева (<i>Polygonum aviculare</i>) – внася се във фаза ВВСН 10-13 (пълно разтваряне на котиледоните-трети същински лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Дозата от 70 мл/продукт/ дка да се прилага на пясъчливи и каменисти почви	П			
6.	АКАМОС 500 Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение №01545-ПРЗ- 2/14.07.2023 г. Заповед № РД 11- 145/18.01.2018 г. Заповед № РД11- 1647/10.07.2023 г.	метобромурон - 500 г/л	400 мл/дка	Картофи Срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-09 Период на покой, клубените не покълват-поникване: стъблата излизат над почвената повърхност Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка – 20-60 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
7.	АКРИС БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01474- ПРЗ-2/16.09.2019 г. Заповед № РД 11- 710/06.04.2017 г. Заповед № РД 11- 1062/19.06.2018 г. Заповед №РД 11- 1736/21.08.2019 г. Заповед №РД 11-2677 от 10.11.2021 г.	диметенамид-П 280 г/л тербутилазин 250 г/л	200-300 мл/дка	Царевича Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели - прилага се във фаза ВВСН 00 -16 (След сеитба преди поникване - след поникване до 6 лист на културата) Брой мин/макс приложения – едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	