

			100-150 мл продукт/ дка	Минимална употреба Ягоди Срещу Ношенки - внася се при установено нападение Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	О	7 дни		
				Минимална употреба Цветя и украсни видове (дървесни и тревисти) Срещу Листни бълхи, Ношенки, Гъботворка (<i>Lymantria dispar</i>) Зелена дъбова листозавивачка (<i>Tortrix viridana</i>), Борова процесионка (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) - внася се при установено нападение Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ АЗАТИН ЕК за контрол на ношенки при ягоди и Листни бълхи, Ношенки, Гъботворка (<i>Lymantria dispar</i>) Зелена дъбова листозавивачка (<i>Tortrix viridana</i>), Борова процесионка (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) при цветя и украсни видове (дървесни и тревисти). Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ АЗАТИН ЕК за контрол на ношенки при ягоди и Листни бълхи, Ношенки, Гъботворка (<i>Lymantria dispar</i>) Зелена дъбова листозавивачка (<i>Tortrix viridana</i>), Борова процесионка (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) при цветя и украсни видове (дървесни и тревисти) е на лицето, прилагащо продукта				
6.	АКТЕЛИК 50 ЕК Синджента България ЕООД Разрешение № 01004-ПРЗ-4/01.09.2020 г. Заповед №РД 11-403/16.03.2016 г. Заповед №РД 11-2464/30.11.2018 г. Заповед №РД 11-1932 от 21.08.2020 г.	500 г/л <u>пиримифос-метил</u>	100 мл/ 100 м ² 0,15 мл/ м ³ 8 мл/ 1 тон	Празни складови помещения и силосни клетки Складови неприятели; С въздушна помпа под налягане, преди складиране Брой мин/макс приложения – 1 Вода 0,02 – 0,05 л/ м ² Празни складови помещения и силосни клетки Складови неприятели; Автоматизиращ електрически разпръсквач М 1026, преди складиране Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка - 1,35 мл/ м ³ Ечемик, Овес Складови неприятели; На конвейерна лента, при прибиране на зърното. третираните ечемик и овес с продукта не могат да се консумират под формата на трици от хора Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка - 0,75 – 1,5 л/ тон	3	-	първа професионална	
7.	АКТЕЛИК ДИМКА № 20 Синджента България ЕООД Разрешение № 01846-ПРЗ-2/01.12.2020 г. Заповед №РД 11-1248 от 09.06.2020 г. Заповед №РД 11-2506 от 05.11.2020 г.	<u>пиримифос-метил</u> 225 г/кг	1 димка/ 570 м ³	Празни силоси и складове за зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, просо, сорго, елда, царевича, ориз, ръж): третиране на съоръженията Срещу Неприятелите в складови помещения: ръждиво-червен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), гъгрици, брашнени молци, брашнен акар (<i>Acarus siro</i>) Брой мин/макс приложения - Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно Интервал между приложенията - 6 седмици (42 дни)	3		първа професионална	Продуктът се прилага в празни складови помещения след мокра дезинсекция
8.	АЛВЕРДЕ 240 СК БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01008-ПРЗ-6/19.01.2022 г. <u>Заповед № РД 12-23/30.04.2009 г.</u> Заповед № РД 11-374/09.05.2011 г. Заповед № РД 11-1245/13.10.2011 г. Заповед № РД 11-840/05.08.2013	240 г/л <u>метафлумизон</u>	20 мл/дка 100 мл/дка	Картофи Срещу Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) – внася се във фаза От ВВСН 15 (разтваряне на петите листа на главното стъбло) до клубените достигат 60-70% от крайното си тегло Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс - 20 – 40 л/дка Минимална употреба Домати Миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-89 (първо съцветие – пълна зрялост)		14 дни картофи 3 дни домати	втора професионална	с несистемно действие