

|     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                        |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|
| 8.  | <b>АКСИАЛ 050 ЕК</b><br>Синджента България ЕООД<br>Разрешение № 01075-5/<br>09.08.2016 г.<br>Заповед РД 11-988 от<br>30.07.2012 г.<br>Заповед №РД 11-<br>1367/25.07.2016 г.                                    | 50 г/л<br><a href="#">пиноксаден</a>                                    | 60-90 мл/дка<br>с 20-40 л/дка<br>работен<br>разтвор | <b>Пшеница и ечемик</b><br>Срещу едногодишни житни плевели в т.<br>ч. див овес - внася се се във фаза братене<br>на културите и от фаза 2-3 лист до фаза<br>братене на плевелите<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка                                                                                                                                                                           | П | - | втора<br>професионална |                          |
| 9.  | <b>АКСИАЛ ЕДНО</b><br>Синджента България<br>ЕООД<br>Разрешение №01121-ПРЗ-<br>5/09.08.2016 г.<br>Заповед №РД 11-<br>1368/25.07.2016 г.                                                                         | 45 г/л <a href="#">пиноксаден</a> +<br>5 г/л <a href="#">флорасулам</a> | 100 мл/дка                                          | <b>Пшеница и ечемик</b><br>Срещу едногодишни житни плевели в т.<br>ч. див овес и широколистни плевели в<br>т.ч. слабочувствителни на хормоно-<br>подобните хербициди плевели - внася се<br>във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите,<br>3-5 лист на житните плевели (3 лист до<br>края на братене на дивия овес) и 2-4 лист<br>на широколистните плевели<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка | П | - | непрофесионална        |                          |
| 10. | <b>АКТИВУС</b><br>Адама Агрикалчър Б.В.,<br>Нидерландия                                                                                                                                                        | <b>Второ търговско име на ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ</b>                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                        |                          |
| 11. | <b>АКУРАТ 20 ВГ</b><br>НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ,<br>Австрия<br>Разрешение № 01396–<br>ПРЗ-2/15.11.2021 г.<br>Заповед №РД 11-<br>683/22.04.2016 г.<br>Заповед №РД 11-762 от<br>17.04.2019 г.<br>Заповед №РД 11-2687 от | <a href="#">метсулфурон-</a><br><a href="#">метил</a> - 200 г/кг        | 2 г продукт /дка                                    | <b>Пшеница (мека и твърда), ечемик<br/>(зимен и пролетен), зимна ръж,<br/>тритикале</b><br>Срещу едногодишни широколистни<br>плевели – внася се във фаза ВВСН<br>13-29 (3 листа разтворени - край на<br>братенето)<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка<br>Да не се прилага след ВВСН 39                                                                                                        | П | - | втора<br>професионална | със системно<br>действие |

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            | <b>FESSS</b><br><b>AGSST</b><br>Да не се прилага при треви за храна на животните<br>Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя /растение)<br>Брой приложения мин/макс – 1<br>Вода л/дка – 20-80 |  |        |                     |  |
| 222 | <b>ПЕНДИ 33 ЕК</b><br>ШАРДА ЕВРОПА<br>Б.В.Б.А., Белгия                                                                                                                                                                                | <b>Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК</b> |            |                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                     |  |
| 223 | <b>ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ /АКТИВУС</b><br>Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия<br>Разрешение №01288 – ПРЗ-3/04.05.2017 г.<br>Заповед № РД11-2037/18.12.2014 г.,<br>Заповед №РД 11-1658/06.11.2015 г. и<br>Заповед №РД 11-827/24.04.2017 г. | <a href="#">пендиметалин</a> - 330 г/л     |            | Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:                                                                                                                                                                           |  | 90 дни | втора професионална |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,4 л/дка  | <b>Пшеница</b><br>Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата                                                                                                                                         |  | 90 дни |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,4 л/дка  | <b>Ечемик</b><br>Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата                                                                                                                                          |  | 90 дни |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,4 л/дка  | <b>Ръж</b><br>Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата                                                                                                                                             |  | 90 дни |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,53 л/дка | <b>Царевица</b><br>Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата                                                                                                                                        |  | 90 дни |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,53 л/дка | <b>Слънчоглед</b><br>Преди поникване на културата                                                                                                                                                                             |  | -      |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,4 л/дка  | <b>Чесън</b><br>Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата                                                                                                                                           |  | 75 дни |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,53 л/дка | <b>Грах</b><br>Преди поникване на културата                                                                                                                                                                                   |  | -      |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,53 л/дка | <b>Картофи</b><br>Преди поникване на културата                                                                                                                                                                                |  | -      |                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,3 л/дка  | <b>Соя</b><br>Преди сеитба или преди поникване на културата                                                                                                                                                                   |  | -      |                     |  |

|     |                                                  |                                     |             |                                                                                                                                                 |        |         |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
|     |                                                  |                                     | 0,4 л/дка   | Лук<br>Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза ВВСН 10-13 на културата                                                        |        | -       |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,530 л/дка | Тютюн<br>Преди разсаждане на културата                                                                                                          |        | -       |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,400 л/дка | Тревни площи<br>След поникване на културата.<br>Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона |        | -       |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,450 л/дка | Объл артишок<br>Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието                                                          |        | 60 дни  |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Карфиол<br>Преди разсаждане на културата                                                                                                        |        | 100 дни |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Броколи<br>Преди разсаждане на културата                                                                                                        |        | 100 дни |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Главесто зеле<br>Преди разсаждане на културата                                                                                                  |        | 100 дни |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Брюкселско зеле<br>Преди разсаждане на културата                                                                                                |        | 100 дни |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,360 л/дка | Нахут<br>Преди поникване на културата                                                                                                           |        | -       |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,360 л/дка | Фасул<br>Преди поникване на културата                                                                                                           |        | -       |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,360 л/дка | Копър<br>Преди или след поникване на културата                                                                                                  | 75 дни |         |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Патладжан<br>Преди разсаждане на културата                                                                                                      | 75 дни |         |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Пипер (зеленчукова култура)<br>Преди разсаждане на културата                                                                                    | 75 дни |         |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Домати<br>Преди разсаждане на културата                                                                                                         | 75 дни |         |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,450 л/дка | Ориз (засят в суха почва)<br>Преди засяване на културата                                                                                        | 90 дни |         |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,450 л/дка | Топола<br>След засаждане                                                                                                                        | -      |         |  |  |
|     |                                                  |                                     | 0,275 л/дка | Украсни (декоративни ) култури (включително разсадници)                                                                                         | -      |         |  |  |
| 224 | ПЕНКОТ 33 ЕК<br>ШАРДА ЕВРОПА<br>Б.В.Б.А., Белгия | Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК |             |                                                                                                                                                 |        |         |  |  |