

				ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка			
			80 мл/дка	Маслодайна рапица Бяло гниене Бяло гниене (склеротиния) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П	21 дни	
14.	АМИСТАР ГОЛД Синджента България ЕООД Разрешение № 01426 – ПРЗ-2/04.12.2019 г. Заповед №РД 11-949/31.05.2016 г. Заповед №РД 11-2405 от 26.11.2019 г.	азоксистробин - 125 г/л дифеноконазол - 125 г/л	100 мл/дка	Зимна маслодайна рапица Сухо стъблено гниене (<i>Leptosphaeria macularia</i>), Склеротинийно гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза Есенно третиране ВВСН 14 Разтворен четвърти лист Пролетно третиране – до ВВСН 65-69 Край на цъфтежа Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	Слънчоглед – 60, Рапица - няма	втора професионална
			100 мл/дка	Пролетна рапица Склеротинийно гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза ВВСН 63-69 От 40% от цветовете на главния цветонос са разтворени до край на цъфтежа Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка			
			100 мл/дка	Слънчоглед Склеротинийно гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Фомоза (черни петна) (<i>Phoma macdonaldii</i>), Фомопсис (сиви петна) (<i>Diaporthe helianthi</i>) ВВСН 20-55 От 10 разтворени листа до фаза бутонът е отделен от най-горните листа Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21			

				дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка				
15.	АРХИТЕКТ БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01994-ПРЗ-1/20.12.2021 г. Заповед №РД 11-2963 от 09.12.2021 г.	пираклостробин – 100 г/л мепикват-хлорид – 150 г/л прохексадион-калций – 25 г/л	120 – 200 мл/дка	Зимна маслодайна рапица Срещу Фомоза (<i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>)), Листни петна (цилиндроспо-роза) (<i>Pyrenopeziza brassicae</i> Повишаване устойчивостта срещу полягане I^{во} третиране наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения) II^{ро} третиране напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - период на зимен покой на култура-тата Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	с комбинирано (системно и несистемно) действие
			100 мл/дка	Зимна маслодайна рапица Срещу Фомоза (<i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>)), Листни петна (цилиндроспо-роза) (<i>Pyrenopeziza brassicae</i> Повишаване устойчивостта срещу полягане – внася се наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П			