

			8-12 г/дка	предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите Марули, предназначени за семепроизводство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera litoralis</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка				
			8 – 12 г/дка	Спанак, салатни растения (полско производство): предназначени за храна ВВСН12-49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроизводство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист - пълно узряване Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera litoralis</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка		3 дни		
			8 – 12 г/дка	Подправки (полско производство): предназначени за храна ВВСН 12-49 предназначени за семепроизводство ВВСН 12-89 Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera litoralis</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка		3 дни		
10.	АМПЛИГО 150 ЗК Синджента България ЕООД Разрешение № 1270-ПРЗ-3/30.06.2023 г. Заповед №РД. 11-2280/12.11.2018 г. Заповед №РД РД11-1354/07.06.2023 г.	50 г/л <u>лямбда-цихалотрин</u> <u>хлорантранилипрол</u> 100 г/л	20 мл продукт/ дка	Домати Срещу Надземни ношенки (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i>) Листни въшки: черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>), памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), зеленоовичеста листна въшка (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Muzus persicae</i>) - внася се във фаза ВВСН 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или ВВСН 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка	П	3 дни	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите.
			30 мл продукт/ дка	Сладка царевича Срещу Царевичен стъблопробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Средиземноморски царевичен стъблопробивач (<i>Sesamia nonagroides</i>), Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се във фаза ВВСН 14-79 (разтваряне на 4-ти лист-почти всички зърна са достигнали окончателния си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка	П	14 дни		
			30 мл продукт/ дка	Царевича Срещу Царевичен стъблопробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Средиземноморски царевичен стъблопробивач (<i>Sesamia nonagrioides</i>)				

				Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се във фаза ВВСН 34-77 Поява (на четвърти възел - съдържание на 60% сухо млекоподобно вещество в зърната от средната част на кочана) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка			
		25 мл продукт/ дка	Картофи Срещу Картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>) – внася се във фаза до ВВСН 60 (до първи отворен цвят) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30 – 80 л/дка		14 дни		
		20 мл продукт/ дка	Артишок Срещу Надземни ношенки: малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), сребристоточкова ношенка (<i>Chrysodeixis chalcites</i>) Листни въшки (<i>Brachycaudus cardui</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> spp.) – внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист - достигната 90% от листната маса на растението) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка		3 дни		