

			25-50 пелети/м³ (=5-10 г РН₃/м³)	След прибиране на реколтата - продукти от зърнено-житни култури, изсушени плодове и зеленчуци, варива - фасул, леща, грах, лупина, маслодайни култури на съхранение, ядки, преработени продукти за консумация, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени билки Срещу Житна гъгрица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гъгрица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obiectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гъгрица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашнен акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> – внася се при съхранение Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 5-14 дни експози-ция													
144.	ТЕПЕКИ/ АФИНТО ИСК БИОСАЙЪНС ЮРЪП Н.В., Белгия Разрешение № 01440–ПРЗ-6/19.01.2022 г. Заповед №РД 11-1560/29.08.2016 г. Заповед №РД 11-2082/22.10.2018 г Заповед №РД 11-28 от 03.01.2020 г. Заповед №РД 11-1590 от 12.07.2021 г. Заповед №РД 11-2183 от 21.09.2021 г. Заповед №РД 11-3177 от 31.12.2021 г.	флоникиамид 500 г/кг	<table><tr><td>14 г/дка</td><td>Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища): Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите</td></tr><tr><td>14 г/дка</td><td>Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, тополи, върби, насаждения от коледни елхи, семенпроизводствени градини, култивирани гори от корков дъб(полско и оранжерийно производство) Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите</td></tr><tr><td>14 г/дка</td><td>Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения, вкл. видовете култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по време на вегетативна фаза) (полско и оранжерийно производство) Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения - 3 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка</td></tr><tr><td>14 г/дка</td><td>Семенпроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и меденцински култури; подправки; цветя, цветни култури; зърнени и бобови култури Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка</td></tr><tr><td>18 г/дка</td><td>Хмел Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка</td></tr><tr><td>14 г/дка</td><td>Тютюн Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка</td></tr><tr><td>10 г/дка</td><td>Домати, патладжан Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3</td></tr></table>	14 г/дка	Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища): Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите	14 г/дка	Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, тополи, върби, насаждения от коледни елхи, семенпроизводствени градини, култивирани гори от корков дъб(полско и оранжерийно производство) Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите	14 г/дка	Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения, вкл. видовете култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по време на вегетативна фаза) (полско и оранжерийно производство) Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения - 3 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка	14 г/дка	Семенпроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и меденцински култури; подправки; цветя, цветни култури; зърнени и бобови култури Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка	18 г/дка	Хмел Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	14 г/дка	Тютюн Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	10 г/дка	Домати, патладжан Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3	П/О	Хмел-21 дни; Пъпеша, Дини, Тикви , Краставици, Корнишони, Тиквички, Домати, патладжан -1 ден; Пшеница, Тритикале, Лимец – 28 дни; Портокал, Лимон, Грейпфрут, Мандарина, клементина, Лайм – 60; Череша, Слива, Праскова, Кайсия, Нектарина -14 дни; Ябълка, Дюля, Круша, Азиатски круши (Наши) – 21 дни; за останалите – не се изисква	втора професионална	Със системно действие
14 г/дка	Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища): Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите																				
14 г/дка	Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, тополи, върби, насаждения от коледни елхи, семенпроизводствени градини, култивирани гори от корков дъб(полско и оранжерийно производство) Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите																				
14 г/дка	Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения, вкл. видовете култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по време на вегетативна фаза) (полско и оранжерийно производство) Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения - 3 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка																				
14 г/дка	Семенпроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и меденцински култури; подправки; цветя, цветни култури; зърнени и бобови култури Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка																				
18 г/дка	Хмел Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка																				
14 г/дка	Тютюн Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка																				
10 г/дка	Домати, патладжан Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3																				

				Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			10 г/дка	Краставици, Корнишони, Тиквички (в оранжерия) Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			10 г/дка	Пъпеш, Дини, Тикви Листни въшки - над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			14 г/дка	Пшеница, Тритикале, Лимец Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
			10 г/дка	Портокали, Лимони, Грейпфрут, Мандарини, кlementини, Лайм Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 100-300 л/дка				
			14 г/дка	Череша Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			14 г/дка	Праскова, Кайсия, Нектарина Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			14 г/дка	Слива Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			14 г/дка	Ябълка, Дюля, Круша, Азиатски круши (Наши) Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				

			14 г/дка	Минимална употреба Зелен грах с шушулки Зелен фасул с шушулки Срещу Зелена грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-71 (първият същински лист (с прилистници) се разтваря или се развива първото мустаче – 10% от шушулките са достигнали типична дължина) БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ТЕПЕКИ за контрол на зелена грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) и черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>) при зелен грах с шушулки и зелен фасул с шушулки. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ТЕПЕКИ за контрол на зелена грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) и черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>) при зелен грах с шушулки и зелен фасул с шушулки е на лицето, прилагащо продукта	П	14 дни		
145.	ТРИКА ЕКСПЕРТ Сипкам Оксон С.П.А., Италия Разрешение № 01302–ПРЗ-3/05.07.2021 г. Заповед № РД 11-247/11.02.2015 г. Заповед № РД 11-1211/ 07.06.2017 г. Заповед №РД 11-1487 от 30.06.2021 г.	ламбда-цихалотрин - 4 г/кг	1000 – 1500 г/дка	Царевица, сорго, просо Ларви на ношенки – <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1	П	-	втора професионална	
			1200 – 1500 г/дка	Царевица, сорго, просо Ларви на западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се във фаза ВВСН 15-18 (от разтваряне на 5-ти лист до разтваряне на 8-ми лист) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	Памук Слънчоглед Рапица, Соя, Моркови Ларви на ношенки – <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	Домати, патладжан, пипер Ларви на ношенки – <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	Тютюн Ларви на ношенки – <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12 – 14 (Фаза развитие на листата 2 – 4 лист) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	Картофи Ларви на ношенки – <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (Фаза кълнене / поникване: период на покой) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	Краставици, тиквички, пъпеш, диня, тиква Ларви на ношенки – <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) - внася се във фаза ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	Марули, салати Ларви на ношенки – <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти	П	-		