

				Брой мин/макс приложения – 1				
37.	БИСМАРК КС Оксон Италия С.п.А Разрешение №01419 – ПРЗ-2/14.02.2017г. Заповед № РД 11- 946/31.05.2016 г. и Заповед №РД 11- 171/24.01.2017 г.	кломазон - 55 г/л пендиметалин - 275 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели	П	-	втора професионална	
			200-250 мл/дка	Памук Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			250-300 мл/дка	Тютюн Внася се преди разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			120-150 мл/дка	Рапица Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200-300 мл/ дка	Аспержи Внася се след беритба, преди показване на новите стъбла над почвата ВВСН 49- 59 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	Резене Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Преди разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	Кориандър Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200-300 мл/дка	Ориз (засят на сухо) Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				

			150-200 мл/дка	Царевича Внасят се преди поникване, рано след поникване ВВСН 00-12 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200-250 мл/дка	Соя Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	Фасул, Грах, Бакла Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	Картофи Внася се преди поникване след загърляне ВВСН 00-10 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	Моркови – внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
38.	БОНАЦА Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения Разрешение № 2001- ПРЗ-2/04.04.2024 г. Заповед №РД 11-224 от 17.02.2022 г. Заповед №РД11- 814/29.03.2024 г.	флуроксипир - 250 г/л флуроксипир- мептил - 360 г/л	60-80 мл продукт/дка	Зимна пшеница, зимен ечемик Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			80 мл продукт/ дка	Царевича- ZEAMX Широколистни плевели (3DICOT) - ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист-разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П			
			60 мл продукт/ дка	Полски мак-PAPRH Широколистни плевели (3DICOT) - ВВСН 16-19 Брой мин/макс приложения - 1 Да не се използва за консумация от хора	П			