			150-200 мл/дка	**Царевица** Внасят се преди поникване, рано след поникване BBCH 00-12 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200-250 мл/дка	**Соя** Внася се след сеитба, преди поникване BBCH 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	**Фасул, Грах, Бакла** Внася се след сеитба, преди поникване BBCH 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	**Картофи** Внася се преди поникване след загърляне BBCH 00-10 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	**Моркови –** внася се след сеитба, преди поникване BBCH 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
38.	**БОНАЦА** Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения Разрешение № 2001-ПРЗ-2/04.04.2024 г. Заповед №РД 11-224 от 17.02.2022 г. Заповед №РД11-814/29.03.2024 г.	флуроксипир - 250 г/л флуроксипир-мептил - 360 г/л	60-80 мл продукт/дка	**Зимна пшеница, зимен ечемик** Срещу широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 12-39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			80 мл продукт/ дка	**Царевица- ZEAMX** Широколистни плевели (3DICOT) - BBCH 12-16 (разтваряне на втори лист-разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П			
			60 мл продукт/ дка	**Полски мак-PAPRH** Широколистни плевели (3DICOT) - BBCH 16-19 Брой мин/макс приложения - 1 Да не се използва за консумация от хора	П			

				или животни. Използва се само като украса и за производство на масло от маково семе, за производство на сапун, бои и лакове. Забележки: Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при минималните употреби. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при минималните употреби.				
39.	**БОРДЪР 480 СК** Синджента България ЕООД Разрешение №01908-ПРЗ-1/26.01.2021 г. Заповед №РД 11-52 от 07.01.2021 г.	месотрион - 480 г/л	Продуктът **БОРДЪР 480 СК е идентичен на ПРЗ КАЛИСТО 480 СК** с Разрешение № 01053 – ПРЗ – Издание: 2/09.10.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.				втора професионална	
40.	**БРАДЪР 500 СК** Мактешим Аган Холдинг Б.В	**Второ търговско име на СУЛТАН 500 СК**						
41.	**БРАСАН 540 ЕК** Синджента България ЕООД Разрешение № 01346 – ПРЗ-2/07.06.2016 г. Заповед №РД 11-1651/06.11.2015 г.; Заповед №РД 11-932/30.05.2016 г. Заповед №РД 11-2019/10.10.2019 г.	диметахлор – 500 г/л кломазон – 40 г/л	200 мл/дка	**Зимна маслодайна рапица** Едногодишни широколистни и някои житни плевели – внася се след сеитба, преди поникване на културата BBCH 00 На една и съща площ, продуктът може да се прилага веднъж на три години Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка		-	втора професионална	