			15-100 (50-100 мл/100 л вода)	**Домати** Срещу *Tuta absoluta* – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	О	3 дни		
			15-80 (50-80 мл/100 л вода)	**Патладжан** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*) – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари	О	3 дни		
			15-100 (50-100 мл/100 л вода)	**Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква)** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*), листоминиращи мухи (*Liromyza trifolii)* – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари	О	3;		
			15-100 (50-100 мл/100 л вода)	**Тиквови с ядлива кора (краставици,корнишони, тивички)** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*), листоминиращи мухи (*Liromyza trifolii)* – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари	О	3 дни		
			15-100 (50-100 мл/100 л вода)	**Ягоди** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*), листоминиращи мухи (*Liromyza trifolii*), ягодов акар (*Phytonemus pallidus*) - – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари	О	3 дни		
			15-100 (50-100 мл/100 л вода)	**Цветни и декоративни растения** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*) - внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 15 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	О	-		
24.	**БРАИ** Лаинко С.А.., Испания Разрешение № 01381–ПРЗ-2/ 07.06.2016 г. Заповед № РД 11-407/16.03.2016 г. Заповед №РД 11-848/19.05.2016 г. Заповед №РД 11-44 от 06.01.2020 г.	пирипроксифен – 100 г/л	50-112,5 мл/дка	**Портокали, мандарини, лимони:** Щитоносни въшки – (*Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae*) – внася се във фаза ВВСН 71-74 Разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – Плодовете достигат 40% от нормалната големина. Край на физиологичното окапване на тъмнозелените плодове Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка За да се избегне поява на резистентност – да не се извършва повече от 1 третиране за вегетационен период. Да не се надвишава дозата от 112,5 мл продукт/дка	П	Портокали, мандарини, лимони – 30 дни; Домати – 3 дни; Ябълки, круши, Праскови, кайсии, сливи, череши – не се изисква	втора професионална	**SPe8–** Опасен за пчелите
			28-50 мл/дка	**Ябълки и круши:** Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus*) – внася се във фаза ВВСН 54-72 Фаза „Миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяна на първите листа – Размер на завръза до 20 мм				

				Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка За да се избегне поява на резистентност – да не се извършва повече от 1 третиране за вегетационен период. Да не се надвишава дозата от 50 мл				
			28-50 мл/дка	**Праскови, кайсии, сливи, череши:** Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus*) – внася се във фаза BBCH 57 Чашелистчетата са отворени; вижда се връхчето на венчето				
			50-112,5 мл/дка	**Домати (оранжерийно производство):** Тютюнева белокрилка – (*Bemisia tabaci),* Оранжерийна белокрилка (*Trialeurodes vaporariorum*) – внася се във фаза BBCH 55-82 Пето съцветие, пети цвят – 20 % от плодовете с типичен цвят на зреене Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка За да се избегне поява на резистентност – да не се извършва повече от 2 третирания за вегетационен период. Да не се надвишава дозата от 112,5 мл продукт/дка				
25.	**БУТЕО СТАРТ** Байер България ЕООД Разрешение №01902-ПРЗ-1/02.12.2020 г. Заповед №РД 11-2668 от 26.11.2020 г.	флупирадифурон - 480 г/л	10,42 мл продукт/1 кг семена (6,25 мл продукт/дка)	**Зимна маслодайна рапица** Срещу Земни бълхи (*Phyllotreta* spp.) Рапична стъблена бълха (*Psylliodes chrysocephala*) – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 12 – 25 мл/1 кг семена	П	-	втора професионална	със системно действие
26.	**БУТИК** Лаинко, С.А., Испания Разрешение № 01734-ПРЗ-3/24.08.2023 г. Заповед РД 11-1516 от 31.07.2019 г. Заповед № РД 11-1605/15.07.2022 г. Заповед № РД 11-1875/08.08.2023 г.	абамектин - 18 г/л	30-100 мл продукт/дка	**Домати** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*), Листоминиращи мухи (*Liriomyza* spp.) – внася се при нападение (не по-късно от BBCH 89-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Да се прилага от март до октомври	О	3 дни	втора професионална	С несистемно действие **Spe8** - Опасен за пчелите. Затворете плътно оранжерията за предотвратяване на случайно влетяване на пчели в нея. Да не се използва през месеците ноември-февруари
			30-100 мл продукт/дка	**Патладжан** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*), Листоминиращи мухи (*Liriomyza* spp.) – внася се при нападение (не по-късно от BBCH 89-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Да се прилага от март до октомври	О	3 дни		
			50-100 мл продукт/дка	**Пъпеши** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*) Листоминиращи мухи (*Liriomyza* spp.) – внася се при нападение (не по-късно от BBCH 89-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Да се прилага от март до октомври	О	3 дни		