

				Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ				
48.	БУТИЗАН S БАСФ ЕООД Удостоверение № 01069-2/04.09.2013 г. Заповед № РД 11-848 от 05.08.2013 Заповед №РД 11-1858/07.08.2023 г.	500 г/л метазахлор		Срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:		70 дни	втора професионална	
			200 мл/дка	Зеле - внася се 8-10 дни след засаждане Фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ				
49.	БУТИЗАН МАКС БАСФ ЕООД Удостоверение № 01258—ПРЗ-1/29.07.2014 г. Заповед №РД 11 – 1048 от 03.07.2014г.	200 г/л метазахлор 200 г/л диметенамид-П 100 г/л квинмерак		Едногодишни житни и широколистни плевели при	П	70 дни	1	
			200-250 мл/дка	Маслодайна рапица приложение: след сеитба, преди поникване на културата - ВВСН 00-06				
			250 мл/дка	Маслодайна рапица приложение вегетационно – на есен: до 2-ри – 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на плевелите(ВВСН 10-14)				
50.	ВАЛЕНТИА Баркли Кемикълс Лимитид, Ирландия Разрешение № 02047-ПРЗ-1/16.11.2022 г. Заповед №РД11-2421/02.11.2022 г.	флорасулам - 2 г/л флуороксибир - 100 г/л	120-160 мл продукт/дка	Зимна пшеница и ечемик Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-45 (само главното стъбло-късна фаза на вретенене) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие Едно приложение на култура за вегетация за всички употреби. Фуражните култури, третирани с ВАЛЕНТИА, не трябва да се използват като фураж за преживни животни
			120-150 мл продукт/дка	Пролетна пшеница и ечемик Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
			120-160 мл продукт/дка	Твърда пшеница Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-45 (само главното стъбло-късна фаза на вретенене) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				

			120-150 мл продукт/дка	Зимно и пролетно тритикале Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
			120-160 мл продукт/дка	Зимен и пролетен овес Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-31 (само главното стъбло-първият възел е поне на 1 см над възела на братене) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
			120-150 мл продукт/дка	Зимна и пролетна ръж Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист)				
				Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
51.	ВЕНТУМ ВГ Байер България ЕООД Удостоверение № 01023-ПРЗ-1/ 05.02.2010 г. Заповед № РД 12-19/10.08.2007 г Заповед №РД 12-56/14.08.2009 г.	300 г/кг форамсулфурон + 10 г/кг йодосулфурон-метил-натрий + антидот - 300 г/кг	10-15 г/дка+ 200 мл/дка Меро (прилепител)	Царевича Срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) – внася се вегетационно във фаза от 2-ри до 6-ти лист на царевичата. Във фаза от котиледони до 6-ти лист на едногодишните широколистни плевели, 3-4 лист на едногодишните житни плевели и при височина на балура от семе и коренища 15 - 25 см		-	3	