

45.	БУЗ УЛТРА ДФ Сулфур Милс Лимитед Франция САС Разрешение № 01696-ПРЗ- 2/06.10.2021 г. Заповед №РД 11- 554/15.03.2019 г. Заповед №РД 11-2256 от 01.10.2021 г.	тебуконазол 750 г/кг - кандидат за замяна	33 г/ дка	Пшеница, спелта, тритикале Срещу Листни петна (ран листен пригор) (<i>Septoria tritici</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внося се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П	28 дни	втора професионална	
			13 г/ дка	Лозя Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe necator</i>) – внося се във фаза ВВСН 30- 81 (Развитие на леторастите - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-14 Вода л/дка мин/макс – 30-120 л/дка	П	14 дни		
46.	ВАЛИС ПЛЮС Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия Разрешение №01663-ПРЗ- 1/06.02.2019 г. Заповед №РД 11-195/ 24.11.2019 г.	Валифенат - 60 г/кг Меден оксихлорид – 262 г/кг (150 г/кг под формата на мед) Меден хидроксид – 261,8 г/кг (150 г/кг под формата на мед)	200 г/ продукт /дка	Лозя (винени и десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внося се във фаза ВВСН13-81 (третите листа са отворени – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10- 12 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка Поради риск от развитие на резистентност площите с лозя да се	П	28 дни	втора професионална	

	третират най-много до два пъти годишно с продукти съдържащи активното вещество валифеналат.		
250 г/ продукт /дка	Домати, Патладжан Срещу Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза BVCH 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	3 дни – домати и патладжан за прясна консумация и 10 дни – за преработка
250 г/ продукт /дка	Картофи Срещу Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза BVCH17-85 (разтваряне на 7-те листа на главното стъбло – плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	7 дни

			250 г/ продукт /дка	Лук, лук - шалот Срещу Мана (<i>Peronospora destructor</i>) - внася се във фаза ВВСН 21-48 9 и повече листа - при 50% от растенията листата са завити Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третиран с продукта лози	П	3 дни		
47.	ВАЛИС Ф Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01890-ПРЗ-2/14.07.2023 г. Заповед №РД 11-2435 от 26.10.2020 г Заповед №РД 11-1659/10.07.2023 г.	<u>валифеналат</u> - 60 г/кг + <u>фолпет</u> - 480 г/кг	200 г продукт/ дка	Лозя (винени сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 15-83 (пет листа са отворени - зърната формират цвят) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третиран с продукта лози	П	28 дни	втора професионална	с комбинирано действие
			250 г/ продукт /дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Мана (<i>Peronospora destructor</i>) - внася се във фаза ВВСН 15-69 (пет листа са отворени - край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третиран с продукта лози	П	-		
48.	ВАРИАНО ЕКСПРО Байер България ЕООД Разрешение №01739-ПРЗ-1/07.08.2019 г. Заповед №РД 11-1450/25.07.2019 г.	<u>биксафен</u> – 40 г/л; <u>флуоксастробин</u> – 50 г/л; <u>протиоконазол</u> – 100 г/л	175 мл/дка	Пшеница Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) - внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-	втора професионална	