			250 г/ продукт /дка	**Лук, лук - шалот** Срещу Мана *(Peronospora destructor)* - внася се във фаза ВВСН 21-48 9 и повече листа - при 50% от растенията листата са завити Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третирани с продукта лози	П	3 дни		
47.	**ВАЛИС Ф** Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01890-ПРЗ-2/14.07.2023 г. Заповед №РД 11-2435 от 26.10.2020 г Заповед №РД11-1659/10.07.2023 г.	валифеналат - 60 г/кг + фолпет - 480 г/кг	200 г продукт/ дка	**Лозя (винени сортове)** Срещу Мана *(Plasmopara viticola)* – внася се във фаза ВВСН 15-83 (пет листа са отворени - зърната формират цвят) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третирани с продукта лози	П	28 дни	втора професионална	с комбинирано действие
			250 г/ продукт /дка	**Лозя (десертни сортове)** Срещу Мана *(Peronospora destructor)* - внася се във фаза ВВСН 15-69 (пет листа са отворени - край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третирани с продукта лози	П	-		
48.	**ВАРИАНО ЕКСПРО** Байер България ЕООД Разрешение №01739-ПРЗ-1/07.08.2019 г. Заповед №РД 11-1450/25.07.2019 г.	биксафен – 40 г/л; флуоксастробин – 50 г/л; протиоконазол – 100 г/л	175 мл/дка	**Пшеница** Срещу Кафява (листна) ръжда *(Puccinia recondita)* - внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-	втора професионална	