

			50 мл продукт/ 100 кг семена	Зимен ечемик Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.), кафява праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
			50 мл продукт/ 100 кг семена	Пролетен ечемик Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) - внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
			50 мл продукт/ 100 кг семена	Овес Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
61.	ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01593-ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед № РД 11-1044/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-505 от 11.03.2021 г.	азоксистробин - 250 г/л	60-80 мл/дка	Пшеница Срещу Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - внася се във фаза ВВСН 29-37 Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	35 дни	непрофесионална	Да се спазва Закона за пчеларството

			80 мл/дка	Ечемик Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка		35 дни		
			80-100 мл продукт/ дка	Маслодайна рапица Срещу Бяло гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка		21 дни		
			Продуктът е идентичен на ПРЗ АМИСТАР 25 СК с Разрешение № 01262-ПРЗ-Издание: 3/02.12.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита					
62.	ГОЛБЕКС ВГ ЕКСКЛУЗИВАС САРАБИЯ, С.А., Испания Разрешение №01753-ПРЗ-1/16.09.2019 г. Заповед №РД 11-1713/20.08.2019 г.	<u>фосетил-алуминий</u> - 800 г/кг	250 г/дка	Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза От ВВСН 12-13 (вторите-третите листа са отворени) до 28 дни преди прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка	П	28 дни	втора професионална	със системно действие
			250 г/дка	Краставици Срещу Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) –превантивни и лечебни третирания след поникване, съобразено с карантинния срок Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3 дни		