

			250 г/дка	Краставици Срещу Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) - внася се превантивни и лечебни третирания след поникване, съобразено с карантинния срок Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	О	3 дни		
			250 г/дка	Домати Срещу Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се превантивни и лечебни третирания след поникване, съобразено с карантинния срок Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		
			250 г/дка	Марули Срещу Мана (<i>Bremia lactacae</i>) – превантивни и лечебни третирания след поникване, съобразено с карантинния срок Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	15 дни		
			600 г/дка	Цитрусови култури Срещу <i>Phytophthora sp.</i> – внася се във фаза ВВСН 37-81 (леторастите са достигнали 70% от крайната си дължина – начало на оцветяване на плода – частично, неравномерно) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	14 дни		
28.	ГОЛБЕКС ВП Индустриал Куимика Кий С.А., Кралство Испания Разрешение № 01892-ПРЗ-1/01.12.2020 г. Заповед №РД 11-2493 от 04.11.2020 г.	фосетил-алуминий - 800 г/кг	250 г/дка	Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза От ВВСН 12-13 (вторите-третите листа са отворени) до 28 дни преди прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка	П	28 дни	втора професионална	със системно действие

300 г/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, круша „Наши“, японска мушмула) Фитофторно гниене (<i>Phytophthora cactorum</i>) - Първо третиране: април-май; второ третиране: юни-юли; трето третиране Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 30 дни Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка Да не се надвишава количеството от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период	П	15 дни
300 г/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, круша „Наши“, японска мушмула) Бактериоза (<i>Pseudomonas syringae</i>) – внася се при опадане на венчелистчетата ВВСН 69-71 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали – размер на завръза до 10 мм: следцъфтежно окапване) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 30 дни Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка Да не се надвишава количеството от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период	П	15 дни
250 г/дка	Краставици Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) – внася се във фаза От ВВСН 10 (котилдените се разгъват напълно) до 3 дни преди прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	О	3 дни

			250 г/дка	Домати Срещу Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза От ВВСН 10 (котилдените се разгъват напълно) до 3 дни преди прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		
			250 г/дка	Марули Срещу Мана (<i>Bremia lactucae</i>) – внася се във фаза От ВВСН 10 (котилените са напълно развити; нарастващия връх или същинския лист видим) до 15 дни преди прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	15 дни		
			600 г/дка	Цитрусови култури Срещу Фитофторно гниене (<i>Phytophthora sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 37- 81 Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 30 дни Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка	П	14 дни		
29.	ЗОРВЕК ЕНДАВИА Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 02042-ПРЗ-1/18.10.2022 г. Заповед №РД11-2157/30.09.2022 г.	оксатиапипролин - 30 г/л бентиаваликарб-изопропил – 70 г/л	40 мл/дка	Картофи Срещу Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза ВВСН 10 (от клубени: първите листенца започват да нарастват) – до карантинния срок Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Интервал 7 дни - при по-силно нападение на болестта	П	7 дни	втора професионална	с комбинирано действие (системно и несистемно)