

			60-100 мл/дка Ръж Срещу Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка					
			60-100 мл/дка Минимална употреба Ечемик (зимен, пролетен) Срещу Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Рамулария (<i>Ramularia collo-cygni</i>) - внася се във фаза ВВСН 30-49 (начало на удължаване на стъблото – видими първи осили (само при осилестите форми)) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДАКСЪР съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДАКСЪР съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.					
66.	ДЕЛАН 700 ВДГ БАСФ ЕООД - България Разрешение № 0513-ПРЗ-2/31.01.2023 г. Заповед №РД 12-62/29.12.2006 г. Заповед № РД 11-	700 г/кг дитианон	50 г/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши) Срещу Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>) – внася се във фаза ВВСН 57-79 (фаза “розов бутон”: удължаване на венчелистчетата; чашелистчетата леко	П	42 дни	втора професионална	

	120/19.01.2023 г.			отворени; поява на венчелистчетата - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер) Брой мин/макс приложения – 1-6 Интервал между приложенията – 6 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка До 6 приложения в доза 50 г/дка				
			75 г продукт/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши) Срещу Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>) – внася се във фаза ВВСН 57-73 (фаза “розов бутон”: удължаване на венчелистчетата; чашелистчетата леко отворени; поява на венчелистчетата - вторично окапване на завърза) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 3 приложения в доза 75 г/дка	П	42 дни		
			50 г продукт/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши) Срещу Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>) – внася се във фаза ВВСН 73-79 (вторично окапване на завърза - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 3 приложения в доза 50 г/дка	П	42 дни		
			50 г продукт/дка	Праскови Срещу Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>) – внася се във фаза ВВСН 53-85 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори - оцветяването се развива) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	35 дни		

			50 г продукт/дка	Череша Срещу Бяла ръжда (<i>Blumeriella jaarii</i>) – внася се във фаза ВВСН 53-85 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори - оцветяването се развива) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	21 дни		
	ДЕЛАН ПРО БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01459 – ПРЗ-4/30.05.2022 г. Заповед №РД 11-146/23.01.2017 г. Заповед №РД 11-1357/26.06.2017 г. Заповед №РД 11-129 от 19.01.2021 г. Заповед №РД 11-976 от 17.05.2022 г.	дистианон - 125 г/л калиев фосфонат – 561 г/л	250 мл/дка	Ябълки, Круши :внася се във фаза ВВСН 53-77 разпукване на пъпките - плодовете са достигнали 70 % от размера Струпясване <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>	П	35 дни	втора професионална	с комбинирано (системно и несистемно действие)
			300 мл/дка	Лозя (винени сортове): внася се във фаза ВВСН 05-15 (развитие на пъпките „мъхеста фаза“: ясно се вижда кафяв мъх – развитие на листата, растежа продължава до пети лист) -Фомопсис (<i>Phomopsis viticola</i> .) Лозя (винени сортове): внася се във фаза ВВСН 15-83 (развитие на листата, растежа продължава до пети лист – зърната формират цвят) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>), Черно гниене (<i>Guignardia bidwellii</i>)		42 дни		
			250 мл/дка	Минимална употреба Ябълка Срещу Алтернария (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 53-77 (разпукване на пъпките – плодовете са достигнали 70% от размера) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 5-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-120 л/дка	П	35 дни		
			250 мл/дка	Минимална употреба Круша Срещу Стемфилиум (<i>Stemphylium vesicarium</i>) – внася се във фаза ВВСН	П	35 дни		