

43.	ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН ТАБЛЕТА Делиция Фрайберг ГмбХ, Федерална република Германия Разрешение № 01826-ПР3-2/15.06.2021 г. Заповед №РД 11-534 от 21.02.2020 г. Заповед №РД 11-1128 от 01.06.2021 г.	алуминиев фосфид - 560 г/кг	3-5 таблетки/ м ³ (=3-5 г РН ₃ /м ³)	Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>) Брой мин/макс приложения - 1	3	Шамфъстък – 35 дни, ядки – 21 дни, продукти от зърнено – житни култури – 14 дни, всички останали – 7 дни	първа професионална	21 дневна експози-ция
			5-10 таблетки/ м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>) Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
			5-10 таблетки/ м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	Тютюн при съхранение Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>) Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция

			5-10 таблетки/ м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	При съхранение на продукти от зърнено – житни, изсушени плодове и зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, маслодайни култури на съхранение, ядки, преработени продукти за консумация, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени билки Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>) Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
44.	ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН ПЕЛЕТА Делиция Фрайберг ГмбХ, Федерална република Германия Разрешение № 01818-ПРЗ-1/06.03.2020 г. Заповед №РД 11-533 от 21.02.2020 г.	алуминиев фосфид - 560 г/кг	15-25 пелети/ м ³ (=3-5 г РН ₃ /м ³)	Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i> Брой мин/макс приложения – 1	3	Шамфъстък – 35 дни, ядки – 21 дни, продукти от зърнено – житни култури – 14 дни, всички останали – 7 дни	първа професионална	21 дневна експози-ция
			25-50 пелети/ м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i> Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 5-14 дни експози-ция