

				памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) и Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка				
41.	ДЕЛТАФАР Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия Разрешение № 01936-ПРЗ-1/05.05.2021 г. Заповед №РД 11-794 от 22.04.2021 г.	<u>делтаметрин</u> - 25 г/л		Продуктът е идентичен с ПРЗ ДЕЛТАГРИ с Разрешение за пускане на пазара и употреба № 01239 – ПРЗ – Издание: 3/20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), изменено със Заповед № РД 11 – 2017/10.10.2019 г. с притежател на разрешението Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия.			втора професионална	SPe8 - Опасен за пчелите
42.	ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН ТАБЛЕТА Делиция Фрайберг ГмбХ, Федерална република Германия Разрешение № 01826-ПРЗ-2/15.06.2021 г. Заповед №РД 11-534 от 21.02.2020 г. Заповед №РД 11-1128 от 01.06.2021 г.	<u>алуминиев фосфид</u> - 560 г/кг	3-5 таблетки/ м ³ (=3-5 г РН ₃ /м ³)	Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephesia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricornis</i>), тютюнев молец (<i>Ephesia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашнен акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>) Брой мин/макс приложения - 1	3	Шамфъстък – 35 дни, ядки – 21 дни, продукти от зърнено – житни култури – 14 дни, всички останали – 7 дни	първа професионална	21 дневна експозиция

			5-10 таблети/ м³ (=5-10 г РН₃/м³) Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашния акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>) Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
			5-10 таблети/ м³ (=5-10 г РН₃/м³) Тютюн при съхранение Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашния акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>) Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
			5-10 таблети/ м³ (=5-10 г РН₃/м³) При съхранение на продукти от зърнено – житни, изсушени плодове и зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, маслодайни култури на съхранение, ядки, преработени продукти за консумация, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени билки Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашния акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и	3			Между 5-14 дни експози-ция

				<i>Tyroglyphus sp.</i> Брой мин/макс приложения - 1				
43.	ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН ПЕЛЕТА Делиция Фрайберг ГмбХ, Федерална република Германия Разрешение № 01818- ПРЗ-1/06.03.2020 г. Заповед №РД 11-533 от 21.02.2020 г.	алуминиев фосфид - 560 г/кг	15-25 пелети/ м³ (=3-5 г РН ₃ /м³)	Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i> Брой мин/макс приложения – 1	3	Шамфъстък – 35 дни, ядки – 21 дни, продукти от зърнено – житни култури – 14 дни, всички останали – 7 дни	първа професионална	21 дневна експози-ция
			25-50 пелети/ м³ (=5-10 г РН ₃ /м³)	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i> Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 5-14 дни експози-ция

			25-50 пелети/ м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	Тютюн при съхранение Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашния акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i> Брой мин/макс приложения – 1	3				Между 5-14 дни експози-ция
			25-50 пелети/ м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	При съхранение на продукти от зърнено – житни, изсушени плодове и зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, маслодайни култури на съхранение, ядки, преработени продукти за консумация, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашния акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i> Брой мин/макс приложения – 1	3				Между 5-14 дни експозиция
44.	ДЕНА ЕК Шарда Кропкем Испания С.ЛІ	Второ търговско име на ДЕКА ЕК							
45.	ДЕСИЖЪН Шарда Кропкем Испания С.ЛІ	Второ търговско име на ДЕКА ЕК							
46.	ДЕЦИС 100 ЕК Байер България ЕООД Разрешение № 01180- ПРЗ-3/20.12.2017 г. Заповед №РД 11- 526/29.04.2013 г.	100 г/л <u>делтаметрин</u>	10,5 – 12,5 мл/дка 12,5 мл/дка	Бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени Листна въшка (<i>Hyalopterus spp.</i>), Ябълков плодов червей (<i>Laspeyresia pomonella</i>), Кестенов молец (<i>Laspeyresia splendana</i>) Бадемов семеяд (<i>Eurytoma plotnikovi</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни		Бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени, захарно цвекло, крмъно цвекло и	Втора професионална	SPe8 - Опасен за пчелите	

Заповед №РД 11-1836/09.12.2015 г. Заповед №РД 11-2609/01.12.2017 г. Заповед №РД 11-2534/11.12.2018 г.				Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка		салатно цвекло, царевица, памук – 30 дни ; Ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, нектарин, кайси и, сливи, череша, вишни, лозя, кромид, праз, чесън, зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи, фасул, леща, нахут, грах, картофи, тютюн–7; Ягоди, домати, пипер, патладжан, красавици, корнишони, тиквички, тъпеша, дини, марули, спанак, магданоз, целина, рукола, цикория, артишок–3; Люцерна – 14; Пшеница, ечемика, ръж, овес и тритикала – 30; Сладка царевица – 3; Маслодайна рапица - 45	
			7,5 - 12,5мл/дка	Ябълки, круши, дюли, мушмули Ябълков плодов червей (<i>Laspeyresia pomonella</i>), Ябълкова листна бълха (<i>Psylla mali</i>), Зелена ябълкова листна въшка (<i>Aphis pomi</i>), Живовлекава листна въшка (<i>Dysaphis plantaginea</i>) Плодова корограизачка (<i>Adoxophyes orana</i>), Розена листозавивачка (<i>Archips rosanus</i>);			
			8,75 – 12,25 мл/дка	Обикновена крушова листна бълха (<i>Psylla pyri</i>)			
			12,25 мл/дка				
			8,75– 12,25 мл/дка	Праскови, нектарини, кайсии, сливи, череша, вишни Плодова корограизачка (<i>Adoxophyes orana</i>), Розена листозавивачка (<i>Archips rosanus</i>), Прасковен молец (<i>Anarsia lineatella</i>); Черешова муха (<i>Rhagoletis cerasi</i>);			
			10–17,5 мл/дка	Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>);			
			12,5– 17,5мл/дка	Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Черешова листна въшка <i>Myzus cerasi</i>), Прашеста сливова листна въшка <i>Hyalopterus pruni</i>), Сливов плодов червей (<i>Laspeyresia funebrana</i>);			
			7,5 -17,5 мл/дка				
			12,5-17,5 мл/дка	Лозя Шарен гроздов молец, (<i>Lobesia botrana</i>) - първо поколение- 12,5мл/дка, второ и трето поколение - 12,5-17,5 мл/дка); Еднопоясен гроздов молец (<i>Clysia ambiguella</i>);			
			12,5- 17,5мл/дка	Лозова цикадка (<i>Empoasca spp.</i>);			
			12,5- 17,5мл/дка				
			6,25– 12,5мл/дка	Ягоди (и в оранжерии): Листни въшки (<i>Aphis spp.</i>) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка			
			7,5 – 12,5мл/дка	Кромид, праз, чесън Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка			
			7,5 - 12,5мл/дка	Домат, пипер и патладжан Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Малка полска ношенка (<i>Spodoptera spp.</i>), Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decehlineata</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Памукова листна въшка <i>Aphis gossypii</i>), Голяма сливова листна въшка (<i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyz lactucae</i>) Южна зелена миризливка (<i>Nezara viridula</i>); Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка			
			4,5 – 7,5 мл/дка				
			7,5 – 12,5 мл/дка				
			7,5–17,5 мл/дка	Пипер (оранжерия) Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), малка полска ношенка (<i>Spodoptera spp.</i>), Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decehlineata</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Памукова листна въшка <i>Aphis gossypii</i>), Голяма			

				Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			7,5-12,5мл/дка	Фасул, леща, нахут Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis spp.</i>), Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			6,25 мл/дка 7,5-12,5 мл/дка	Грах Зелена грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), Грудков хоботник (<i>Sitona spp.</i>); Черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>), -Тъмна грахова листозавивачка (<i>Laspeyresia nigricana</i>), Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			12,5 мл/дка 7,5 - 12,5мл/дка	Артишок Щитовка (<i>Cassida spp.</i>) Тютюнев червей (<i>Spodoptera litura</i>), Листни въшки (<i>Anuraphis cardui</i> , <i>Myzus persicae</i>) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			12,5мл/дка 7,5-12,5 мл/дка	Картофи Колорадски бръмар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>); Египетска ношенка по памука (<i>Spodoptera littoralis</i>) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			12,5-17,5мл/дка 12,5 мл/дка 7,5-12,5 мл/дка	Памук Розов червей по памука (<i>Pectinophora gossypiella</i>), Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>); Тютюнева белокрилка (<i>Bemisia tabaci</i>), Южна цикадка (<i>Empoasca spp.</i>); Ношенки (<i>Spodoptera spp.</i>), Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Подгризваща ношенка(<i>Agrotis spp.</i>) ;				
			7,5-12,5 мл/дка	Тютюн Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), Подгризваща ношенка(<i>Agrotis spp.</i>) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			7, 5-12,5мл/дка 12,5мл/дка	Захарно цвекло, кръвно цвекло и салатно цвекло Черна бобова листна въшка(<i>Aphis fabae</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Цвеклова муха (<i>Pegomya spp.</i>), Западна цвеклова бълха (<i>Chaetocnema tibialis</i>), Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>), Полска ношенка (<i>Spodoptera spp.</i>); Цвеклова щитовка (<i>Cassida nebulosa</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			7, 5-12,5мл/дка	Царевица Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Sesamia nonagrioides</i>), Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>), Полска ношенка (<i>Spodoptera spp.</i>), Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Брястова листна въшка (<i>Rhopalosiphum padi</i>), Овесена листна въшка (<i>Sitobion avenae</i>) Брой мин/макс прил				

			12,5мл/дка	Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera</i>)				
			7, 5- 12,5мл/дка	Пшеница, ечемик, ръж, овес Брястова листна въшка (<i>Rhopalosiphum padi</i>), Овесена листна въшка (<i>Sitobion avenae</i>), Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			6, 25 мл/дка	Люцерна Грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), Детелинов хоботник (<i>Apion pisi</i>), малък Люцернов листов хоботник (<i>Hypera postica</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			6,25- 12,5мл/дка 4,375- 8,75мл/дка 12,3 мл/дка	Декоративни растения Листни въшки (<i>Myzus spp.</i>), Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>); Листозавивачки (<i>Archips spp.</i> , <i>Adoxophyes spp.</i> , <i>Pandemis spp.</i>); Оранжерийна белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка				
			7,5 мл/дка	Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале Срещу Обикновен житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка				
			5 мл/дка 6,3 мл/дка	Маслодайва рапица Срещу Рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceutorhynchus napi</i>) Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephalus</i>) Рапична листна оса (<i>Athalia rosae</i>) Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се при поява Листни въшки (Сем. <i>Aphididae</i>) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-15 л/дка				
			6,3 мл/дка 7,5 мл/дка	Минимални употреби Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале Листоминиращи мухи (сем. <i>Agromyzidae</i>), Галици (Сем. <i>Cecidomyiidae</i>) Цикади (сем. <i>Cicadellidae</i>) Голяма жълто-зелена въшка (<i>Metopolophium dirhodum</i>) Житна листозавивачка (<i>Cnephasia pascuana</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка				
			5 мл/дка 7,5 мл/дка 12,5 мл/дка	Минимална употреба Сладка царевича Светлокрака зелена бълха (<i>Phyllotreta nemorum</i>) Гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) Средиземноморски царевичен стъблопробивач (<i>Sesamia nonagriodes</i>), Цикади (сем. <i>Cicadellidae</i>), Огневки (сем. <i>Pyralidae</i>)				

			5 мл/дка 6,3 мл/дка	Минимална употреба Маслодайна рапица Черен рапичен стъблен хоботник (<i>Ceutorhynchus picitarsis</i>), Светлокрака зелена бълха (<i>Phyllotreta nemorum</i>) Зелев молец (<i>Plutella xylostella</i>) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-15 л/дка				
47.	ДЕЦИС ТРАП Байер България ЕООД Разрешение № 1247- ПРЗ -2/20.12.2017 г. Заповед №РД 11- 849/20.06.2014г. Заповед №РД11- 2604/01.12.2017 г. Заповед №РД11- 2535/11.12.2018 г.	0,015г - <u>делтаметрин</u> / капан (диспенсър) + атрактанти-амониев ацетат, триметиламин хидрохлорид, кадаверин	5–8 капана/ дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмула и др.) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – внася се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1		-	непрофесионална	5- 8 капана/дка Капаните се поставят от южната страна в короната на дърветата на височина 1,40 – 1,80 м от земята
			5–8 капана/ дка	Костилкови овощни видове (праскови, нектарини, череши, сливи, кайсии и др.) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – внася се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1				
			5–8 капана/ дка	Лозя Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – внася се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1				
48.	ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ Байер България ЕООД Разрешение № 01829- ПРЗ-1/16.03.2020 г. Заповед №РД 11-628 от 05.03.2020 г	<u>делтаметрин</u> – 0,015 г/капан	5-10 капана/дка	Череш Срещу Черешова муха (<i>Ragoletis cerasi</i>) – внася се след ВВСН 69 край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) и при начало на летеж на пеперудите - поставяне на капаните на дърветата на височина 1,80-2,00 м. от земята	П		непрофесионална	-
49.	ДЕША ЕК Шарда Кропкем Испания С.Л	Второ търговско име на ДЕКА ЕК						
50.	ДИАБЛО Индустриас Афраз С.А., Испания Разрешение № 01493- ПРЗ-1/ 20.07.2017 г. Заповед №РД 11- 1363/26.06.2017 Заповед №РД 11-571 от 28.03.2022 г.	<u>хекситиазокс</u> – 100 г/кг	25–50 г/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	21 дни	втора професионална	
			40–50 г/дка	Семкови овощни видове (ябълка и круша) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	П	28 дни		
			15-37.5 г/дка	Цитрусови култури (портокали, мандарини, лимони и грейпфрут) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Panonychus citri</i> Внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-250 л/дка	П	14 дни		
51.	ДИАБЛО СК Индустриас Афраз С.А., Испания Разрешение № 01630- ПРЗ-1/15.10.2018 г. Заповед № РД11- 1981/09.10.2018 г. Заповед №РД 11-568 от	<u>хекситиазокс</u> 258,7 г/л	6-15 мл/дка	Цитрусови култури (лимони, мандарини, портокали, грейпфрут) Срещу <i>Panonychus citri</i> , <i>Eotetranychus carpini</i> , Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 100-250 л/дка 6 мл продукт/100 л вода	П	14 дни	втора професионална	

	28.03.2022 г.		6-20 мл/дка	Семкови овошни видове (ябълки, круши) Срещу Обикновен паяжинообразу-ващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка 20 мл продукт/ 100 л вода	П	28 дни		
			10-20 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Срещу Обикновен паяжинообразу-ващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка 20 мл продукт/100 л вода Забележка: Да се използва преди акарите да достигнат възрастни форми.	П	21 дни		
52.	ДИКАРЗОЛ 10 СП Гован Италия С.Р.Л., Италия Разрешение № 01289 – ПРЗ-3/15.06.2021 г. Заповед №РД11-1735/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-2327/19.11.2018 г. Заповед №РД 11-1151 от 02.06.2021 г.	<u>форметанат</u> - 90 г/л	556 г/дка	Кайсия Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза ВВСН 67 Увяхване на цветовете (пове-чето венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	Дини Пъпеш Тикви -3; Домати Патладжани – 14;	непрофесионална	При спазване закона за пчеларството SPe8 - Опасен за пчелите
			556 г/дка	Праскови (нектарини) Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза ВВСН 67 Увяхване на цветовете (пове-чето венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	Домати Патладжани Маруля, маруля айсберг, шикория, салата и други		
			556 г/дка	Лозя (десертно грозде) Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза ВВСН 63-64 Ранен цъфтеж: 30% опадане на ресите – 40% опадане на ресите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка	П	салати принадлежащи на сем. Кръстоцветни (<i>Brassicaceae</i>) Декоративни и цветни култури		
			556 г/дка	Декоративни и цветни култури Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се по време на цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс –100 л/дка	П/О	Лозя (десертно грозде) Праскови (нектарини) Кайсия – не се изисква		
			556 г/дка	Маруля, маруля айсберг, шикория, салата и други салати принадлежащи на сем. Кръстоцветни (<i>Brassicaceae</i>) Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза ВВСН 14 -15 Разтворен четвърти същински лист – разтворен пети същински лист Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс –50 л/дка	П			
			556 г/дка	Домати Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>) Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза Цъфтеж – узряване на плодовете и семената Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс –100 л/дка	П/О			
			556 г/дка	Патладжани Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>) Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза цъфтеж – узряване на плодовете и семената Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс –100 л/дка	П/О			

			556 г/дка	Дни Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-89 Поява на цвета или цветните бутони – пълна зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П			
			556 г/дка	Пъпещи Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>)/Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>) Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-89 Поява на цвета или цветните бутони – пълна зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П			
			556 г/дка	Тикви Калифорнийски трипс (<i>Franklinella occidentalis</i>), Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>) Трипси (<i>Thrips spp</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-89 поява на цвета или цветните бутони – пълна зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П			
53.	ДИПЕЛ ДФ СУМИТОМО КЕМИКЪЛ АГРО ЮРЪП С.А.С. Разрешение № 1915- ПРЗ-1/03.2021 г. Заповед №РД 11-131 от 19.01.2021 г.	<u>Bacillus thuringiensis</u> <u>subsp. Kurstaki шам</u> <u>ABTS-351</u> - 540 г/кг	50-150 г продукт/ дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши) Срещу Ларви на пеперуди, включващи: листозавивачки (<i>Archips rosanus</i> , <i>Archips podana</i> , <i>Tortrix</i> sp.), ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) – внася се при поява на млади ларви (1 ^{-ва} възраст) на всяко поколение Брой мин/макс приложения – 3-8 Интервал между приложенията – 6 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-	непрофесионална	
			75-150 г продукт/ дка	Костилкови овощни видове (праскови, кайсии, череши, сливи) Срещу Ларви на пеперуди, включващи: прасковен клонков молец (<i>Anarsia lineatella</i>), източен плодов червей (<i>Grapholita molesta</i>) – внася се при поява на млади ларви (1 ^{-ва} възраст) на всяко поколение Брой мин/макс приложения – 3-10 (2-5 на поколение) Интервал между приложенията – 3-16 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	-		
			50-100 г продукт/ дка	Лозя Срещу Ларви на пеперуди, включващи: шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>), еднопоясен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i>) - първо третиране в стадий на развитие на яйцето „черни очи“, 2 дни преди излюпване Брой ми/макс приложения – 1-8 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка	П	-		
			75-100 г продукт/ дка	Ориз Срещу Ларви на пеперуди, включващи: <i>Mythimna unipuncta</i> , видове от род <i>Spodoptera</i> - при излюпване на ларвите (1 ^{-ва} възраст) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 40-50 л/дка	П	-		

			20-50 г продукт/ дка	Царевица Срещу Ларви на пеперуди, включващи: памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>) – внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение Брой мин/макс приложения – 1-6 (1-3 на поколение-ние) Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка	П	-		
			75-100 г продукт/ Дка	Зелеви култури (броколи, зеле, карфиол, китайско зеле, кейл), Плодни зеленчуци (бамя, пъпеш, домати, пипер, патладжан), Листни зеленчуци (ескароле, маруля) Стъблени зеленчуци (артишок, праз) Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (<i>Mamestra brassicae</i>), <i>Depressaria erinaceella</i> , домати миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), видове от род <i>Heliothis</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , бяла (голяма) зелева пеперуда (<i>Pieris brassicae</i>), рясна пеперуда (<i>Artogeia rapae</i>), видове от род <i>Plusia</i> , зелев молец (<i>Plutella xylostella</i>), видове от род <i>Plutella</i> , градинска ношенка (<i>Lacanobia oleracea</i>), гамозначна ношена (<i>Autographa gamma</i>), <i>Spodoptera littoralis</i> , други видове от род <i>Spodoptera</i> , <i>Trichoplusia ni</i> дяволска пеперуда (<i>Cynthia cardui</i>) – внася се при излюпване на ларвите (1 ^{-ва} възраст) Брой мин/макс приложения - 1-8 (1-3 на поколение-ние) Интервал между приложенията - приблизително 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,	П	-		
			50-100 г продукт/ дка	Зеленчукови култури (краставици домати пипер, патладжан), фасул Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (<i>Mamestra brassicae</i>), домати миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), видове от род <i>Heliothis</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , видове от род <i>Plusia</i> , градинска ношенка (<i>Lacanobia oleracea</i>), гамозначна ношена (<i>Autographa gamma</i>), <i>Spodoptera littoralis</i> , видове от род <i>Spodoptera</i> , <i>Trichoplusia ni</i> – внася се при излюпване на ларвите (1 ^{-ва} възраст) Брой мин/макс приложения - 1-8 (1-3 на поколение-ние) Интервал между приложенията - приблизително 7 дни Вода л/дка мин/макс – количество работен разтвор да покрива изцяло растенията, без стичане	О	-		
			15-40 г продукт/ дка	Памук Срещу Ларви на пеперуди, включващи: памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>) – внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение Брой мин/макс приложения – 10 (1-3 на поколение-ние) Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка	П	-		
			15-75 г продукт/ дка	Тютюн Срещу Ларви на пеперуди, включващи: памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>) – внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-		

			75-100 г продукт/ дка	Декоративни растения Срещу Ларви на пеперуди, включващи: видове от род <i>Mamestra sp.</i> , памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), <i>Heliothis sp.</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , сребристоточкова ношенка (<i>Chrysodeixis chalcites</i>) – внася се при излюпване на ларвите (1 ^{-ва} възраст) Брой мин/макс приложения - 1-8 (1-3 на поколение) Вода л/дка мин/макс - в зависимост от хабитуса на растенията за пълно покритие	О	-		
			37,5-75 г продукт/ дка	Маслини Срещу Маслинов костилков пробивач (<i>Prays oleae</i>) - първо приложение при 5-25% отворени цветове Брой мин/макс приложения - 3-10 (2-5 за поколение) Интервал между приложенията – 3-16 дни Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка	П	-		
			50-100 г продукт/ дка	Цитрусови култури Срещу Ларви на цитрусов молец (<i>Prays citri</i>) – внася се по време на цъфтеж, при поява на ларви 1 ^{-ва} възраст Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс - 200-400 л/дка	П	-		
			50-150 г продукт/ дка	Минимална употреба Ядкови (черупкови) овощни видове Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (<i>Archips rosanus</i> <i>Archips podana</i>), видове от род <i>Hyponomeuta</i> вкл. <i>Hyponomeuta padellas</i> , <i>Hyponomeuta malinellus</i> – внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение Брой мин/макс приложения - 3-10 (2-5 за поколение) Интервал между приложенията – 3-16 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	-		
			50-150 г продукт/ дка	Минимална употреба Семкови овощни видове Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. дървесница (<i>Zeuzera pyrina</i>) и листозавивачки (<i>Tortrix sp</i>) – внася се при поява на млади ларви (1 ^{-ва} възраст) на всяко поколение Брой мин/макс приложения – 3-8 дни Интервал между приложенията – 6 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-		
			75-150 г продукт/ дка	Минимална употреба Костилкови овощни видове Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (<i>Archips rosanus</i> <i>Archips podana</i>), ябълков молец (<i>Yponomeuta sp</i>) – внася се при поява на млади ларви (1 ^{-ва} възраст) на всяко поколение Брой мин/макс приложения - 3-10 (2-5 на поколение) Интервал между приложенията – 3-16 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	-		

			50-100 г продукт/ дка	Минимална употреба Лозя Срещу Ларви на пеперуди - първо третиране в стадий на развитие на яйцето „черни очи“, 2 дни преди излюпване Брой мин/макс приложения - 1-8 (1-4 на поколение) Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка	П	-		
			15-40 г продукт/ Дка	Минимална употреба Памук Срещу Ларви на пеперуди, в т. ч. розов червей (<i>Pectinophora gossypiella</i>) – внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение Брой мин/макс приложения – 10 (1-3 на поколение) Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка	П	-		
			75-100 г продукт/ дка	Минимална употреба Зелеви култури, Плодни зеленчуци, Листни зеленчуци, Стъблени зеленчуци Срещу Ларви на пеперуди, в т.ч. нощенки (<i>Noctuide</i>), <i>Mamestra</i> , <i>Acrolepiopsis assectella</i> , <i>зимна ноценка (Agrotis segetum)</i> <i>Evergestis forficalis</i> – внася се при излюпване на ларвите (1 ^{ва} възраст) Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение) Интервал между приложенията - приблизително 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	-		
			20-50 г продукт/ дка	Минимална употреба Царевица Срещу Ларви на пеперуди, в т.ч. нощни пеперуди (<i>Sesamia Monagroides</i> , <i>S. cretica</i>), царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) - при поява на млади ларви, от всяко поколение Брой мин/макс приложения – 1-6 (1-3 на поколение) Интервал между приложенията - 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	-		
			50-100 г продукт/ дка	Минимална употреба Зеленчукови култури (пипер, краставица, патладжан, домати), фасул Брой мин/макс приложения - 1-8 (1-3 за поколение) Интервал между приложенията - приблизително 7 дни Вода л/дка мин/макс - количество работен разтвор да покрива изцяло расте-нията, без стичане	О	-		
			75-100 г продукт/ дка	Минимална употреба Ориз Срещу Ларви на пеперуди - при излюпване на ларвите (1 ^{ва} възраст) Брой мин/макс приложения - 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 40-50 л/дка	П	-		
			75-100 г продукт/ дка	Минимална употреба Декоративни растения Срещу Ларви на пеперуди - при излюпване на ларвите (1 ^{ва} възраст) Брой мин/макс приложения - 1-8 (1-3 на поколение)	О	-		

				Интервал между приложенията – приблизително 7 дни Вода л/дка мин/макс – в зависимост от хабитуса на растенията, за пълно покритие Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ДИПЕЛ ДФ за минималните употреби в Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ДИПЕЛ ДФ за минималните употреби в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта				
54.	ДИПЕЛ 2 X Валент Биосайънсис - САЩ Удостоверение № 0231/24.11.2004 г. Протокол № 6 от 2000 г. на Министерство на земеделието за пререгистрация на продукти за растителна защита и Санитарно разрешително № 00683-1/2001 г.	<u>Bacillus thuringiensis var. kurstaki strain ABTS – 351</u> 32000 ME за 1 мг готов продукт	0,1 % 100 г/дка	Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Гъсеници на бяла американска пеперуда по овощни култури Гъсеници на бяла американска пеперуда по горски култури Гъсеници на златозадка Гъботворка Борова процесионка Зелева нощенка по зеле Бяла зелева пеперуда по зеле		-	3	
55.	ДИСАЙД Шарда Кропкем Испания С.Л. Разрешение № 02052-ПР3-1/16.11.2022 г. Заповед №РД11-2385/01.11.2022 г.	<u>делтаметрин</u> – 50 г/л	25 мл /дка 25 мл /дка	Зеле, карфиол Срещу листни въшки – внася се във фаза ВВСН 11-43 (разтворен първи същински лист-30% от очаквания размер на главата е достигнат) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Зеле, карфиол Срещу гъсеници, вкл. гъсеници на ряпна пеперуда (<i>Pieris rapae</i>), зелева пеперуда (<i>Pieris brassicae</i>), зелева нощенка (<i>Mamestra brassicae</i>) внася се във фаза ВВСН 11-43 (разтворен първи същински лист-30% от очаквания размер на главата е достигнат) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	П	7	втора професионална	с несистемно действие SPe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използване. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.
56.	ДИФАЗ Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 02082-ПР3-1/03.07.2023 г. Заповед №РДРД11-1404/09.06.2023 г.	азоксистробин - 200 г/л + дифеноконазол - 125 г/л	60-80 мл продукт/дка 100 мл продукт/дка	Захарно цвекло Срещу Церкоспороза (кръгли листни петна) (<i>Cercospora beticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-39 (листата покриват 10% от повърхността-листата покриват 90% от повърхността) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка Домати Срещу Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се при първи видими симптоми ВВСН 20-59 (10 или повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия)	П П	21 дни 3 дни	втора професионална	

				Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложението – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка				
			100 мл продукт/ дка	Домаги Срещу Алтернария (<i>Alternaria</i> sp.) – внася се при първи видими симптоми ВВСН 20-59 (10 или повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложението – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	3 дни		
			100 мл продукт/ дка	Лук Срещу Ръжда (<i>Puccinia allii</i>) – внася се при първи видими симптоми ВВСН 41-49 (основите на листата започват да се удебеляват-листата са загинали) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложението – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	П	14 дни		
			100 мл продукт/ дка	Минимална употреба Патладжан Срещу Брашнеста мана (<i>Oidium</i> sp.) – внася се ри първи видими симптоми ВВСН 20-59 Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложението – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	3 дни		
			100 мл продукт/ дка	Минимална употреба Артишок Срещу Мана (<i>Bremia</i> sp.) – внася се при първи видими симптоми ВВСН 41-81 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложението – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Забележки: БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ДИФА3 за борба срещу вредител или група вредители, с които се води борба от Приложение № 2. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ДИФА3 за борба срещу житни и широколистни плевели при царевица е на лицето, прилагащо продукта.	П	7 дни		
57.	ЕКЗАЛТ Кортева Агрисайънс България ЕООД, България Разрешение № 01790- ПРЗ-2/13.09.2021 г. Заповед №РД 11- 2633/17.12.2019 г. Заповед №РД 11-1920 от 23.08.2021 г.	<u>спинеторам</u> – 25 г/л	200 мл продукт /дка	Главесто зеле, брюкселско зеле, карфиол, броколи Срещу Разред Lepidoptera (ношенки от род Spodoptera, бяла зелева пеперуда (<i>Pieris brassicae</i>), зелев молец (<i>Plutella xylostella</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), зелева ношенка (<i>Mamestra brassicae</i>)) – внася се във фаза: Зеле: ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брюкселско зеле, карфиол и броколи: ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени –зелетата под последната зелка затворени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	7 дни	втора професионална	SPe 8 - Опасен за пчелите. Да се спазва Закона за пчеларството. Със системно действие
			200-240 мл продукт/ дка	Краставици, корнишони, тиквички Срещу Трипси (<i>Thrips</i> sp.), калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera sp.)) – внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)	П	3 дни		

				Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка				
			200-240 мл продукт/ дка	Краставици, корнишони, тиквички Срещу Трипси (<i>Thrips sp.</i>), калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera sp.)) – внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното себдо е напълна разтворен - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дка	О	3 дни		
			240 мл продукт/ дка	Черно френско грозде, червени боровинки, червено френско грозде, боровинка Срещу Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-89 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 28 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П/О	3 дни		
			200 мл продукт/ дка	Маруля, полска мотавилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), Разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera sp.)) – внася се във фаза ВВСН 11-49 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3 дни		
			200 мл продукт/ дка	Маруля, полска мотавилка, посевна ерука Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), Разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera sp.)) внася се във фаза ВВСН 11-49 Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 14, в оранжерия Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		
			200 мл продукт/ дка	Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново -дърво, магданоз, розмарин, градински чай, машерка Срещу Ношенки от род Heliothis и Spodoptera, Трипси (<i>Thrips sp.</i>) внася се във фаза ВВСН 11-49 Брой мин/макс приложения – 1-3 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3 дни		
			200 мл продукт/ дка	Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново -дърво, магданоз, розмарин, градински чай, машерка Срещу Ношенки от род Heliothis и Spodoptera, Трипси (<i>Thrips sp.</i>) внася се във фаза ВВСН 11-49 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3 дни		
			200 мл продукт/ дка	Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново -дърво, магданоз, розмарин, градински чай, машерка Срещу Ношенки от род Heliothis и Spodoptera, Трипси (<i>Thrips sp.</i>) внася се във фаза ВВСН 11-49 Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	О	3 дни		

			200 мл продукт/ дка	Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera)) внася се във всички фенофази Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	-		
			200 мл продукт/ дка	Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera)) внася се във всички фенофази Брой мин/макс приложения –3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	О	-		
			200-240 мл продукт/ дка	Пипер, лют пипер Срещу Доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>), калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), Разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera)) – внася се във фенофаза BVCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	Пипер, лют пипер Срещу Доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>), Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), Разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera)) – внася се във фенофаза BVCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения –3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка	О	3 дни		
			240 мл продукт/ дка	Малина Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фенофаза BVCH 11-89 Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	3 дни		
			240 мл продукт/ дка	Малина Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фенофаза BVCH 11-89 Брой мин/макс приложения –1 Интервал между приложенията - 28 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	О	3 дни		
			200 продукт/ дка	Ягоди Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera, петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фенофаза BVCH 11-89 (Първи развит лист - втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	3 дни		

			200 продукт/ дка	Ягоди Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera, петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фенофаза BVCH 11-89 (Първи развит лист - втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения –3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	О	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	Домат патладжан Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), Разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera, доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>))- внася се във фаза BVCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	Домат патладжан Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), Разред Lepidoptera (памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera, доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>))- внася се във фаза BVCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения –1 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка	О	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	Пъпеш, Диня, Тиква Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera – внася се във фаза BVCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка	П	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	Пъпеш, Диня, Тиква Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки от род Spodoptera– внася се във фаза BVCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения –3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка	О	3 дни		
58.	ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК Асценза Агро СА, Португалия Разрешение № 01889- ПР3-1/22.10.2020 г.	<u>пирипроксифен</u> - 100 г/л	28-50 мл продукт /дка	Семкови овошни видове (Ябълки, круши) Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка	П	-	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите

	Заповед №РД 11-2404 от 21.10.2020 г.		28-50 мл продукт /дка	Костилкови овошни култури (Сливи, череши, кайсии, нектарини, праскови) Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка	П	-		
			50-80 мл продукт /дка	Домати Белокрилки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes sp.</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка Да не се надвишава общото количество от 125 мл продукт/дка за вегетационен период	О	3 дни		
			25-112,5 мл продукт /дка	Цитрусови култури (портокали, лимони, лайм, грейпфрут и тангериини) Щитоносни въшки (<i>Aonidiella sp.</i> , <i>Aspidiotus sp.</i> , <i>Saissetia sp.</i> , <i>Lepidosaphes beckii</i> , <i>Parlatoria pergandei</i>) – внася се Май-юни Август-септември Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	30 дни		
59.	ЕЛЕКТИЦИД Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 02056-ПР3-1/16.11.2022 г. Заповед №РД11-2415/02.11.2022 г.	бифеназат - 240 г/л	40 мл продукт/дка	Украсни култури (неядливи) Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	О	-	втора професионална	инсектицид/акарициди с несистемно действие Spe8 - Опасен за пчелите
60.	ЕРАДИКОТ МАКС Сертис Белхим Б.В., Нидерландия Разрешение № 01740-ПР3-3/03.04.2023 г. Заповед №РД 11-1449/25.07.2019 г. Заповед №РД 11-1338 от 23.06.2020 г. Заповед № РД 11-109/18.01.2023 г. Заповед № РД11-541/09.3.2023 г.	малтодекстрин - 476 г/л	4-6 л продукт /дка	Всички ядливи и неядливи култури Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), Белокрылки (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) – внася се във всички фази на развитие Брой мин/макс приложения – 1-20 Интервал между приложенията – 3 Вода л/дка мин/макс – 20-300 л/дка Препоръчва се 20 мл продукт на литър вода	О	-	втора професионална	Spe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Не използвайте там, където пчелите активно търсят храна. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност С несистемно действие
			1,5-3 л продукт /дка	Круши Срещу Обикновена крушова листна бълха (<i>Cacopsylla pyri</i>) – внася се във фаза ВВСН 69-89 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали - консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост). При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка 1,5-2 л продукт/100 л вода	П			
			0,5-2,25 л продукт /дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Щитоносни въшки – внася се във фаза ВВСН 69-89 (край на цъфтежа - плодът е готов за беритба) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка 1-1,5 л продукт/100 л вода	П			
			0,5-2,25 л продукт /дка	Лозя Срещу Акари (<i>Eryophiide</i>) – внася се във фаза ВВСН 01-53 (начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката - съцветията се виждат изцяло)	П			

				При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода				
		0.3-3 л продукт /дка		Култури от сем. <i>Solanaceae</i> (домати, пипер, патладжан) Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се във фаза До ВВСН 89 (до пълна зрялост) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 3 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода	П			
		0.3-3 л продукт /дка		Тиквови култури с ядлива кора (краставици, тиквички) Срещу Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) - ВВСН 01-53 (начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката - съцветията се виждат изцяло) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 3 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 1.5-2 л продукт/100 л вода	П			
		0.3-3 л продукт /дка		Тиквови култури с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква) Срещу Листни въшки, обикновен аяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се във фаза До ВВСН-89 (до пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 3 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 1.5-2 л продукт/100 л вода	П			
		0.3-3 л продукт /дка		Листни зеленчуци (марули, спанак и др.) Срещу Листни въшки – внася се във фаза До ВВСН 89 (до пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 3 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 1.5-2 л продукт/100 л вода	П			
		0.3-3 л продукт /на дка		Ягоди Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се До ВВСН 89 (втора реколта: повечето плодове са оцветени) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 3 Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 1.5-2 л продукт/100 л вода	П			
		1-4.5 л продукт /на дка		Цитруси (портокали, мандарини, лимони и др.) Срещу Акари (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>), щитососни въшки (<i>Planococcus</i> sp., <i>Icerya purchasi</i> , <i>Delottococcus aberia</i>) – внася се във фаза ВВСН 69-89 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са окапали) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-300 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода	П			
		1-4.5 л продукт		Минимална употреба Сладък бадем	П			

			/дка	Срещу Щитоносни въшки – внася се във фаза ВВСН 69-89 При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-300 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода				
			1-4.5 л продукт /дка	Минимална употреба Орех Срещу Щитоносни въшки – внася се във фаза ВВСН 69-89 При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-300 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода	П			
			1-4.5 л продукт /дка	Минимална употреба Шамфъстък Срещу Щитоносни въшки – внася се във фаза ВВСН 69-89 При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-300 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода	П			
			1-4.5 л продукт /дка	Минимална употреба Лешник Срещу Щитоносни въшки – внася се във фаза ВВСН 69-89 При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-300 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЕРАДИКОТ МАКС за контрол на щитоносни въшки при сладък бадем, орех, шамфъстък и лешник. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЕРАДИКОТ МАКС за контрол на щитоносни въшки при сладък бадем, орех, шамфъстък и лешник е на лицето, прилагащо продукта	П			
61.	ЕРКОЛЕ ГР Сипкам Оксон С.П.А., Италия Разрешение № 01301–ПРЗ-2/05.07.2021 г. Заповед №РД 11-250/11.02.2015 г. Заповед №РД 11-1486 от 30.06.2021 г.	<u>дамбда-цихалотрин</u> - 4 г/кг (кандидат за замяна)	1000 – 1500 г/дка	Царевича, сорго, просо Срещу Ларви на ношенки- <i>Noctuidae (Agrotis spp.)</i> , ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae (Melolontha spp.)</i> , телени червеи - <i>Elateridae (Agriotes spp.)</i> – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1	П	-	втора професионална	
			1200-1500 г/дка	Царевича Сорго Просо Срещу Ларви на западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се във фаза ВВСН 15-18 (от разтваряне на 5-ти лист до разтваряне на 8-ми лист) Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1000-1500 г/дка	Памук Слънчоглед Рапица, Соя, Моркови Срещу Ларви на ношенки- <i>Noctuidae (Agrotis spp.)</i> , ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae (Melolontha spp.)</i> , телени червеи - <i>Elateridae (Agriotes spp.)</i> – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1000-1500 г/дка	Домати Пипер Патладжан Срещу Ларви на ношенки- <i>Noctuidae (Agrotis spp.)</i> , ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae (Melolontha spp.)</i> , телени червеи - <i>Elateridae (Agriotes spp.)</i> – внася се във фаза ВВСН 12-				

				16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло) Брой мин/макс приложения – 1				
			1000-1500 г/дка	Тютюн Срещу Ларви на нощенки- <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-14 (фаза на развитие на листата 2-4 лист) Брой мин/макс приложения – 1				
			1000-1500 г/дка	Картофи Срещу Ларви на нощенки- <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (фаза покълване/ поникване-период на покой) Брой мин/макс приложения – 1				
			1000-1500 г/дка	Краставици Тиквички Дини Пъпеш Тикви Срещу Ларви на нощенки- <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-14 (2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен) Брой мин/макс приложения – 1				
			1000-1500 г/дка	Марули Салати Срещу Ларви на нощенки- <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 6-ти същински лист) Брой мин/макс приложения – 1				
			1000-1500 г/дка	Зелеви култури Срещу Ларви на нощенки- <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист) Брой мин/макс приложения – 1				
			1000-1500 г/дка	Цветя и декоративни култури, Овощни култури (разсадници и млади дръвчета) Срещу Ларви на нощенки- <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-14 (първи листа са с напълно разгънати петури) Брой мин/макс приложения – 1				
			1000-1500 г/дка	Култури за семенепроизводство Срещу Ларви на нощенки- <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), ларви на бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>) Всички посочени по-горе култури в същите дози и начини на приложение				
62.	ЕСТРЕЛІА ВГ/ ЛІАМША ВГ/ АДАЛАМ ВГ/	ламбда-цихалотрин – 25,6 г/кг	40 – 80 г/дка	Праскови, нектарини Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i> .) – внася се при поява на неприятеля	-	праскови, нектарини, картофи - 7	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите

	ИНДУЛАМ ВГ Шарда Европа б.в.б.а., Белгия Разрешение № 01303- ПР3-3/ 15.09.2016 г. Заповед №РД 11-1568/ 29.08.2016 г.		40 – 80 г/дка	Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 15 дни Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка				
				Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Листни въшки (<i>Aphis spp.</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 15 дни Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка				
63.	ЕСТЮОЙЛ Ексклузивас Сарабиа С.А., Испания Разрешение № 01612- ПР3-1/13.09.2018 г. Заповед №РД 11- 1740/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-3043 от 14.12.2021 г.	<u>парафиново масло</u> (CAS № 8042-47-5) - 790 г/л	0.375 - 1.5 л продукт /дка	Костилкови овощни видове (кайсии, череши, праскови, нектарини и сливи) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), черничева щитоносна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) – внася се преди ВВСН 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлзелени сектори) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-	втора професионална	
			0.375 - 1.5 л продукт /дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, китайска круша – Наши) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се преди ВВСН 60 (отворени първи цветове) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-		
64.	ЕФИМЕТРИН 10 ЕК /ЦАЙПЕР 10 ЕК/ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК К и Н Ефтимиадис България ЕООД Разрешение № 01056- ПР3-5/19.01.2022 г. Заповед РД 11- 458/28.03.2014г., Заповед РД 11- 632/09.05.2014г. и Заповед № РД 11- 410/16.03.2016 г. Заповед №РД 11- 334/23.02.2018 г. Заповед РД 11- 1517/31.07.2019 г. Заповед №РД 11-3185 от 31.12.2021 г.	100 г/л <u>циперметрин</u>	25 мл/дка	Пшеница, ръж и тритикале Срещу Листни въшки по листата и класа при житни култури - внася се във фаза ВВСН 51 – ВВСН 77 на пролет; ВВСН 09 – ВВСН 21 на есен Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка		житни култури (пшеница, ръж и тритикале) – 21 дни; рапица – 7 дни; лозя – 7 дни; картофи – 7; ябълки – 14 дни;	втора професионална	SPe8 - Опасен за пчелите
			15 мл/дка	Рапица Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) - листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				
			50 мл/дка	Лозя Листно приложение при поява на неприятеля				
			40 мл/дка	Лозова листозавивачка Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				
			20 мл/дка	Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				
			30 мл/дка	Ябълки Миниращ молец и Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) - листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				

65.	ЗУУМ 11 СК Сумитомо Кемикал Агро Юрп S.A.S., Франция ОТНЕТО Разрешение №01298 – ПРЗ-2/16.06.2015г. Заповед №РД11- 2369/22.11.2018 г. Заповед №РД 11-1555 от 07.07.2021 г. Считано от 31.07.2022 г. се определят gratisни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЗУУМ 11 СК етикетирани в съответствие с Разрешение № 01298- ПРЗ Издание: 2/16.06.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ.	етоксазол – 110 г/л	25-50 мл/дка	Ябълка, Круша Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), Червен оwoщен акар (<i>Panonychus ulmi</i>)	П	Ябълка, Круша – 28дни; Праскова, нектарина, кайсия – 14 дни; Лимон, портокал, мандарина, грейпфрут, помело – 14 дни; Лозя (десертни и винени)-28 дни; Домати, Патладжан – 3дни; Дини, пъпеши – 3дни; Ягоди – 3дни; Памук – 35 дни; Декоративни рози – не се изисква;	непрофесионална	
			25-50 мл/дка	Праскова, нектарина, кайсия Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), Червен оwoщен акар (<i>Panonychus ulmi</i>)	П			
			30-50 мл/дка	Лимон Портокал Мандарина Грейпфрут Помело Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), Червен оwoщен акар (<i>Panonychus ulmi</i>)	П			
			12,55-25 мл/дка	Лозя (десертни и винени) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), Червен оwoщен акар (<i>Panonychus ulmi</i>)	П			
			12,55-50 мл/дка	Домати, Патладжан (оранжерийно и полско производство) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	П/О			
			30-35 мл/дка	Дини, пъпеши (полско производство) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	П			
			40-50 мл/дка	Ягоди (оранжерийно и полско производство) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	П/О			
			30- 37,5мл/дка	Памук Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	П			
			25-50 мл/дка	Декоративни рози Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	О			
66.	ИКЕБАНА ТРИПЪЛ АКСИОН Ротам Агрокемикъл Юрп Лтд, Обединено кралство ОТНЕТО Разрешение № 01752- ПРЗ-1/16.09.2019 г. Заповед № РД 11- 1712/20.08.2019 г. Заповед №РД 11- 2177/21.09.2023 г. Считано от датата на издаване на настоящата заповед се определят gratisни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ИКЕБАНА ТРИПЪЛ АКСИОН , етикетирани в	абамектин 0,015 г/л делтаметрин 0,010 г/л тебуконазол 0,200 г/л	4,484 л продукт/ дка	Декоративни растения (тревисти и дървесни растения) Срещу Листни въшки, гъсеници, акари Брашнеста мана Ръжди – внася се във всяка една фаза на развитие на културата при поява на повреди от неприятеля или симптоми на болестта Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията - 7	3	-	непрофесионална	С комбинирано действие -

	съответствие Разрешение № 01752- ПРЗ-Издание: 2/15.06.2021 г.							
67.	ИНАЗУМА Суми Агро Европа Лимитид – клон Германия Разрешение № 2106- ПРЗ-1/17.11.2023 г. Заповед № РД 11- 2647/08.11.2023 г.	ацетамиприд– 100 г/кг + лямбда-цихалотрин– 30 г/кг (кандидат за замяна)	15 г/дка	Пшеница (зимна) Вредна житна дървеница (<i>Eurygaster integriceps</i>), обикновена житна пиявица (<i>Oulema melanopus</i>), листни въшки (<i>Aphis</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка	П	-	втора професионална	със системно и несистемно действие SPe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели.
			20 г/дка	Царевица Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>), западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) - до ВВСН 51 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30 – 50 л/дка	П			
			20 г/дка	Маслодайна рапица (зимна) Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephalus</i>), зелеви бълхи (<i>Phyllotreta</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 11-19 (разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка	П			
			20 г/дка	Маслодайна рапица (зимна) Рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceutorhynchus napi</i>), зелев стъблен скритохоботник (<i>Ceuthorhynchus pallidactylus /quadridens/</i>) Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-50 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия - наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка	П			
			20 г/дка	Минимална употреба Царевица Сив царевичен хоботник (<i>Tanytrecus dilaticollis</i>) – внася се до до ВВСН 51 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П			
			20 г/дка	Минимална употреба Маслодайна рапица (зимна) Рапична листна оса (<i>Athalia rosae</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-19 (разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагашо продукта.	П			
68.	ИНСЕКТОЙЛ КИИ Индустриал Кимика Кий АД, Испания Разрешение № 01613- ПРЗ-1/13.09.2018 г. Заповед № РД 11- 1748/29.08.2018 г.	<u>парафиново масло</u> (CAS № 8042-47-5) - 790 г/л	0.375 - 1.5 л продукт /дка	Костилкови овощни видове (кайсии, череши, праскови, нектарини и сливи) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus pernicosus</i>), черничева щитоносна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) – внася се преди ВВСН 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) Брой мин/макс приложения –1	П	-	втора професионална	

	Заповед №РД 11-3050 от 14.12.2021 г.			Вода л/дка – 50-150 л/дка				
			0.375 – 1.5 л продукт /дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, китайска круша – Наши) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidotus perniciosus</i>) – внася се във фаза Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка – 50-150 л/дка	П	-		
69.	ИНФИС Лаинко С.А./Lainco S.A., Испания Разрешение №01713-ПРЗ-1/23.04.2019 г. Заповед №РД 11-768 от 17.04.2019 г.	делтаметрин 25 г/л	50 мл/дка	Патладжан Срещу Листни въшки: Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Зеленоовичеста листна въшка (голяма картофена листна въшка) (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Ношенки: Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите
			50 мл/дка	Домати Срещу Листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Зеленоовичеста листна въшка (голяма картофена листна въшка) (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Ношенки: памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), сребристо точкова ношенка (<i>Chrysodeixis chalcites</i>) гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>) египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) зимна ношенка (<i>Agrotis segetum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		
			50 мл/дка	Тиквички Срещу Листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Ношенки: гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		
			50 мл/дка	Краставици Корнишони Срещу Листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Ношенки: памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), <i>Spodoptera sp.</i> ипсилонова ношенка (<i>Agrotis ipsilon</i>), Зимна ношенка (<i>Agrotis segetum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		

			50 мл/дка	Пъпеш Срещу Листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) Ношенки: гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), ипсилонова ношенка (<i>Agrotis ipsilon</i>), зимна ношенка (<i>Agrotis segetum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		
			50 мл/дка	Диня Срещу Листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), зеленовичеста листна въшка (голяма картофена листна въшка) (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) ношенки: гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3 дни		
			50 мл/дка	Карфиол, Броколи Срещу Листни въшки: зелева листна въшка (<i>Brevicoryne brassicae</i>), <i>Lipaphis erysimi</i> , зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>); Бяла (голяма) зелева пеперуда (<i>Pieris brassicae</i>), Репна пеперуда (<i>Pieris rapae</i>), Зелев молец (<i>Plutella xylostella</i>) Ношенки: памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), зелева ношенка (<i>Mamestra brassicae</i>), египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>), ипсилонова ношенка (<i>Agrotis ipsilon</i>), зимна ношенка (<i>Agrotis segetum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	7 дни		
			40 мл/дка	Маслини за консумация и за производство на зехтин Срещу Маслинов молец (<i>Prays oleae</i>) - да не се третира след края на цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	П	-		
			50 мл/дка	Ягоди Срещу Листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), <i>Aphis ruborum</i> <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) Ношенки: ипсилонова ношенка (<i>Agrotis ipsilon</i>)- при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3 дни		
70.	К-ОБИОЛ 2022 ИНВАЙЪРМЕНТАЛ	делтаметрин – 25 г/л	Пропускли ви повърхност	Дезинсекция на складове От разред Coleoptera: житната гърица Sitophilus granarium (<i>Linnaeus</i>), сем. Dryophthoridae	3		втора професионална	

	САЙТНСИС СЕР РО С.Р.Л., Румъния Разрешение № 01190-ПРЗ-4/17.05.2023 г. Заповед № РД 11-1087/14.10.2013г. Заповед № РД 11-12/07.01.2016 г. Заповед № РД 11-61/15.01.2016 г. Заповед № РД 11-1022/04.05.2023 г		и - 40-60 мл от продукта се разтварят в 10 литра вода (0,4-0,6%). Разходна норма: 10 литра работен разтвор за 100 кв. метра повърхност	оризовата гърица <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus), сем. Dryophthoridae суринамския брашнояд <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus), сем. Sylvanidae ръждивочервения брашнен бръмбар <i>Tribolium castaneum</i> (Herbs), сем. Tenebrionidae зърновия бръмбар <i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius), сем. Tenebrionidae от разред Lepidoptera зърновия молец <i>Sitotroga cerealella</i> (Oliver), сем. Gelechiidae молеца по сушените плодове <i>Plodia interpunctella</i> (Hubner), сем. Pyralidae <i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton), сем. Pyralidae				
			Непропуск ливи повърхност и 40-60 мл от продукта се разтварят в 5 литра вода (0,8-1,2%). Разходна норма: 5 литра работен разтвор за 100 кв. метра повърхност					
			1% във вода (1л. разреден продукт на тон зърно)	Директно третиране на зърнени култури разред Coleoptera: житната гърица <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus), сем. Dryophthoridae оризовата гърица <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus), сем. Dryophthoridae суринамския брашнояд <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus), сем. Sylvanidae ръждивочервения брашнен бръмбар <i>Tribolium castaneum</i> (Herbs), сем. Tenebrionidae зърновия бръмбар <i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius), сем. Tenebrionidae от разред Lepidoptera зърновия молец <i>Sitotroga cerealella</i> (Oliver), сем. Gelechiidae молеца по сушените плодове <i>Plodia interpunctella</i> (Hubner), сем. Pyralidae <i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton), сем. Pyralidae		7 дни- за третирана продукция		
			1% във вода (1л. разреден продукт на тон зърно)	Директно третиране на зърнено-бобови култури Фасулевия зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) Say сем. Chrysomelidae, разред Coleoptera		7 дни- за третирана продукция		
71.	К-ОБИОЛ 6 УЛВ 2022 ИНВАЙЪРМЕНТАЛ САЙТНСИС СЕР РО С.Р.Л., Румъния Разрешение № 01754-ПРЗ-2/17.05.2023 Заповед № РД 11-1714/20.08.2019 г.	делтаметрин 6 г/л	4,2 л/100 т зърно (преван-тивно) 8,4 л/100 т зърно (при отчетено нападение)	Складирани зърнено-житни култури, вкл. малц от пивоварен ечемик и пшеница, ориз, царевича, зърнено-бобови култури Срещу Складови неприятели: житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), зърнов бръмбар (<i>Rhyzopertha dominica</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) – внася се във фаза	3	-	втора професионална	С несистемно действие

	Заповед № РД11-1023/04.05.2023 г.			след прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения - 1				
72.	КОЛОМБО ПРО СБМ ДЕВЕЛОПМЪНТ, Франция Разрешение № 01773-ПРЗ-1/18.11.2019 г. Заповед №РД11-2147/31.10.2019 г.	циперметрин - 8 г/кг	1,2 кг продукт/ дка	Царевича Сладка царевича Срещу Западен коренов царевич червей (<i>Diabrotica virgifera</i>) Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-	непрофесионална	С несистемно действие
			1,2 кг продукт/ дка	Сорго Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ дка	Слънчоглед Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Моркови, хрян, целина, пащърнак, корен от магданоз, репички, жълта ряпа Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Морковена муха (<i>Psila rosae</i>) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Червено цвекло Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) - внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Главесто зеле брюкселско зеле, броколи, карфиол Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Зелена коренова въшка (<i>Delia radicum</i>) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Домати, патладжан Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			2,4 кг продукт/ дка	Картофи Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		

			1,2 кг продукт/ Дка	Чесън, лук, дребен лук Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Лукова муха (<i>Delia antiqua</i>) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Пъпеш, дини Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Краставици Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Тиквички Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Тикви Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (BVCH 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Маслодайна рапица Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Зелена муха (<i>Delia brassicae</i>) Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) – внася се при сеитба (BVCH 00) на дълбочина 2 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Тютюн Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Памук Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (BVCH 00) на дълбочина 4 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Торф, трева Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (BVCH 00) на дълбочина 2 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		

			1,2 кг продукт/ Дка	Минимална употреба Домати, пипер, картофи Срещу Попово прасе (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) – внася се при разсаждане/сеитба Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Минимална употреба Торф, трева Срещу Майски бръмбар (<i>Melolontha melolontha</i>) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на КОЛОМБО ПРО при минимални употреби.	П	-		
73.	ЛЕБРОН 0,5 Г Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия Разрешение № 01738- ПРЗ-2/21.03.2022 г. Заповед №РД 11- 1451/25.07.2019 г. Заповед №РД 11-1105 от 28.05.2021 г. Заповед №РД 11-349 от 02.03.2022 г.	тефлулутрин – 5 г/кг	1 - 1.5 кг продукт/дка	Броколи, брюкселско зеле, къдраво зеле, китайско зеле, алабаш Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), Ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), галообразуващ зелен хоботник (<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i>), стоножки (Miriapoda), <i>Tipula sp.</i> , зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>), майски бръмбар (<i>Melolontha</i> <i>melolontha</i>) – внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1	П	-	непрофесионална	
			1 - 1.5 кг продукт/дка	Памук Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), ношенки (<i>Agrotis sp.</i>) – внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1.5 - 2.0 кг продукт/дка	Карфиол, главесто зеле Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), галообразуващ зелен хоботник (<i>Ceutorhynchus</i> <i>pleurostigma</i>), стоножки (Miriapoda) <i>Tipula sp.</i> , зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>), майски бръмбар (<i>Melolontha melolontha</i>) – внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1,5- 2.0 кг продукт	Домати, патладжани, пъпеш, диня Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), Ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), Стоножки (Miriapoda), <i>Tipula sp.</i> , зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>), майски бръмбар (<i>Melolontha melolontha</i>) – внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1.2 - 1.5 кг продукт	Царевица, сладка царевица, сорго Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), Ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera</i>), зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>), стоножки (<i>Scutigerella immaculate</i>), <i>Tipula sp.</i> – внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1,5- 2.0 кг продукт	Марули и други салати, фасул, грах Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), ношенки, (<i>Agrotis sp.</i>), галообразуващ зелен хоботник (<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i>), стоножки (Miriapoda), <i>Tipula sp.</i> , зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>), майски бръмбар (<i>Melolontha</i> <i>melolontha</i>) – внася се при разсаждане /сеитба Брой мин/макс приложения – 1	П	-		

			1,5- 2.0 кг продукт	Целина, копър Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), стоножки (Miriapoda), <i>Tipula sp.</i> , морковена муха (<i>Chamaepsila rosae</i>), зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>) майски бръмбар (<i>Melolontha melolontha</i>) – внася се при разсаждане /сеитба Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1,5- 2.0 кг продукт	Шведска ряпа Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), Ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), галообразуващ зелев хоботник (<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i>), морковена муха (<i>Chamaepsila rosae</i>), стоножки (Miriapoda), <i>Tipulasp.</i> , зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>) майски бръмбар (<i>Melolontha melolontha</i>) – внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1.2 - 1.5 кг продукт/дка	Слънчоглед, соя Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>) -внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1.2 - 1.5 кг продукт/дка	Захарно цвекло Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), малко цвеклово бръмбарче (<i>Atomaria linearis</i>), цвеклова бълха (<i>Chaetocnema tibialis</i>), стоножки (<i>Scutigerella immaculate</i>), <i>Tipula sp.</i> -внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1.2 - 1.5 кг продукт/дка	Тютюн Срещу телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>), ношенки (<i>Agrotis sp.</i>), <i>Tipula sp.</i> -внася се при разсаждане (BVCH 12) Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
			1.0 - 1.5 кг продукт/дка	Репички Срещу зелеви мухи (<i>Delia spp.</i>) – внася се по време на разсаждане Брой мин/макс приложения – 1	П	-		
74.	ЛАМДЕКС ЕКСТРА Адама Агрикалчър Б.В, Нидерландия Разрешение № 1265- ПР3-5/25.07.2018 г. Заповед № РД 11- 1760/10.11.2014 г., Заповед №РД 11- 419/10.03.2015 г., Заповед №РД 11- 1242/17.07.2015 г., Заповед №РД 11- 701/22.04.2016 г., Заповед №РД 11- 1295/19.07.2016 г. Заповед № РД 11- 1285/12.07.2018 г. Заповед №РД 11-10 от 02.01.2020 г	ламбда-цихалотрин - 25 г/кг	120 г/дка	Цитрусови култури (портокал, лимон, мандарина, клементина Листни въшки – (сем. <i>Aphididae</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка	П	7 дни	втора професионална	SPe8-Опасен за пчелите
			60-160 г/дка	Цитрусови култури (портокал, лимон, мандарина, клементина Зелева дървеница (<i>Cimex sp.</i>), Мухи – (разред <i>Diptera</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка	П	7 дни		
			40-60 г/дка	Праскови, нектарини,кайсии, сливи Листни въшки (сем. <i>Aphididae</i>) – при достигане на ПИВ Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			60-70 г/дка	Праскови, нектарини,кайсии, сливи, череши Плодови мухи – при достигане на ПИВ Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка				
			70 г/дка	Праскови, нектарини, кайсии Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>), Прасковен кронков морец – (<i>Anarsia lineatella</i>) – при достигане на ПИВ Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка				