

			5 мл/дка 6,3 мл/дка	Минимална употреба Маслодайна рапица Черен рапичен стъблен хоботник (<i>Ceutorhynchus picitarsis</i>), Светлокрака зелена бълха (<i>Phyllotreta nemorum</i>) Зелев молец (<i>Plutella xylostella</i>) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-15 л/дка				
47.	ДЕЦИС ТРАП Байер България ЕООД Разрешение № 1247- ПРЗ -2/20.12.2017 г. Заповед №РД 11- 849/20.06.2014г. Заповед №РД11- 2604/01.12.2017 г. Заповед №РД11- 2535/11.12.2018 г.	0,015г - <u>делтаметрин</u> / капан (диспенсър) + атрактанти-амониев ацетат, триметиламин хидрохлорид, кадаверин	5–8 капана/ дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмула и др.) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – внася се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1		-	непрофесионална	5- 8 капана/дка Капаните се поставят от южната страна в короната на дърветата на височина 1,40 – 1,80 м от земята
			5–8 капана/ дка	Костилкови овощни видове (праскови, нектарини, череши, сливи, кайсии и др.) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – внася се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1				
			5–8 капана/ дка	Лозя Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – внася се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1				
48.	ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ Байер България ЕООД Разрешение № 01829- ПРЗ-1/16.03.2020 г. Заповед №РД 11-628 от 05.03.2020 г	<u>делтаметрин</u> – 0,015 г/капан	5-10 капана/дка	Череш Срещу Черешова муха (<i>Ragoletis cerasi</i>) – внася се след ВВСН 69 край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) и при начало на летеж на пеперудите - поставяне на капаните на дърветата на височина 1,80-2,00 м. от земята	П		непрофесионална	-
49.	ДЕША ЕК Шарда Кропкем Испания С.Л	Второ търговско име на ДЕКА ЕК						
50.	ДИАБЛО Индустриас Афраз С.А., Испания Разрешение № 01493- ПРЗ-1/ 20.07.2017 г. Заповед №РД 11- 1363/26.06.2017 Заповед №РД 11-571 от 28.03.2022 г.	<u>хекситиазокс</u> – 100 г/кг	25–50 г/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	21 дни	втора професионална	
			40–50 г/дка	Семкови овощни видове (ябълка и круша) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	П	28 дни		
			15-37.5 г/дка	Цитрусови култури (портокали, мандарини, лимони и грейпфрут) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Panonychus citri</i> Внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-250 л/дка	П	14 дни		
51.	ДИАБЛО СК Индустриас Афраз С.А., Испания Разрешение № 01630- ПРЗ-1/15.10.2018 г. Заповед № РД11- 1981/09.10.2018 г. Заповед №РД 11-568 от	<u>хекситиазокс</u> 258,7 г/л	6-15 мл/дка	Цитрусови култури (лимони, мандарини, портокали, грейпфрут) Срещу <i>Panonychus citri</i> , <i>Eotetranychus carpini</i> , Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 100-250 л/дка 6 мл продукт/100 л вода	П	14 дни	втора професионална	