

				Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка				
	ДИАГОНАЛ Албоу ТКИ д.о.о., Словения Разрешение №01668-ПРЗ-2/02.10.2023 г. Заповед №РД 11-346/15.02.2019 г. Заповед №РД11-2186/21.09.2023	азоксистробин – 250 г/л	Продуктът е с идентичен на ПРЗ ЛЕГАДО Разрешение №01601-ПРЗ-2/30.06.2023 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			непрофесионална		
67.	ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М/РАНКОНА НЕО Синджента България ЕООД Разрешение № 01036-ПРЗ-6/22.11.2023 г. Заповеди № РД 09-791/28.12.2002 г. Заповеди №РД 12-62/29.12.2006 г. Заповед № РД 11-1217/11.11.2013 г. Заповед №РД 11-1657/06.11.2015 г. Заповед №РД 11-2232/05.11.2018 г Заповед №РД РД11-1360/07.06.2023 г. Заповед №РД11-2597/07.11.2023	30 г/л дифенокназол	150м л/100 кг семена 167-200 мл /100 кг семена 187,5 – 200 мл /100 кг семена	Пшеница Твърда главня (<i>Tilletia caries</i>) и Фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>) Вджуджаваща главня (<i>Tilletia controversa</i>), -Праховита главня (<i>Ustilago segetum var. tritici</i>) Септориоза (<i>Leptosphaeria nodorum</i>)		-	втора професионална	със системно действие
			150 мл/100 кг семена	Ръж Фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>) Стъблена главня (<i>Urocystis occulta</i>)				
68.	ДИМИКС 500 СК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия Разрешение № 01331 – ПРЗ-3/19.01.2022 г. Заповед №РД 11-1107/24.06.2015 г. Заповед РД 11-1490 /30.07.2019 г. Заповед №РД 11-3176 от 31.12.2021 г.	диметоморф – 500 г/л	30-36 мл/дка	Картофи Внася се във фаза ВВСН 11-89 Разтваряне на първите листа на главното стъбло – плодовете от първото плоодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	П	Картофи-7 дни Лозя -28 дни	първа професионална	
			34 мл/дка	Лозя Внася се във фаза ВВСН 53-79 Съцветията се виждат изцяло – повечето зърна се събират, грозда се затваря Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) Прилага се в резервоарна смес с				

				Интервал между приложенията – 10-12 дни Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка Домати само за прясна консумация				
			200 мл/дка	Пипер Срещу Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) – внася се във фаза ВВСН 60-89 (първо съцветие - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-12 дни Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка	О	3 дни		
146.	ЛЕГАДО Албоу ТКИ д.о.о., Словения Разрешение №01601-ПРЗ-2/30.06.2023 г. Заповед №РД 11-1262/12.07.2018 г. Заповед №РД 11-2402/02.11.2022 г. Заповед № РД 11-1351/07.06.2023 г.	азоксистробин - 250 г/л	80 мл/продукт/дка	Краставици, корнишони, тиквички Срещу Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложения – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	1 дни	втора професионална	със системно действие
			80 мл/продукт/дка	Пъпеш, тикви, дини Срещу Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) - – внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложения – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	3 дни		
			80-100 мл/продукт/дка	Домати Срещу Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) - – внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложения – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	3 дни		

100 мл/продукт/ дка	Пшеница (зимна и пролетна) Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), ръжда (<i>Puccinia</i> spp.), листни петна (септориоза) (<i>Septoria tritici</i>), фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.) – внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни
100 мл/продукт/ дка	Ечемик (зимен и пролетен) Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), ръжда (<i>Puccinia</i> spp.), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium</i> spp.) – внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни
100 мл/продукт/дка	Ориз Срещу пирикулариоза (<i>Pyricularia oryzae</i>), хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium</i> spp.) – внася се на пролет ВВСН 43-87 (средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-въсърсна зрелост (твърда консистенция)) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	28 дни
50 мл продукт /дка	Картофи Срещу Алтернария (<i>Alternaria solani</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 mm) от първото съцветие (главно	П	7 дни

	стъбло) - плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка		
80-100 мл продукт /дка	Зрял грах, зелен грах (зърна), зелен грах (шушулки) Срещу Аскохитоза (<i>Ascochyta pisi</i>), ръжда (<i>Uromyces pisi</i>) – внася се във фаза ВВСН 17-72 (7 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 7 мустачета - 20 % от шушулките са достигнали типична дължина) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка	П	14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива
80-100 мл продукт /дка	Бакла Срещу Аскохитоза (<i>Ascochyta fabae</i>), Ръжда (<i>Uromyces</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 20-79 (няма странични разклонения - почти всички бобове са достигнали крайна дължина) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка	П	14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива
80-100 мл продукт /дка	Зелен фасул Срещу Аскохитоза (<i>Ascochyta fabae</i>), Ръжда (<i>Uromyces</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 20-79 (няма странични разклонения - чушки: отделни фасулиев зърна се виждат лесно) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни	П	14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива

	Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка		
100 мл продукт /дка	Маслодайна рапица Срещу Алтернария (Alternaria sp.) – внося се във фаза ВВСН 60-67 (отворени първите цветове - прецъфтяване: по-голяма част от венчелистчетата окапали) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	21 дни
80-100 мл продукт /дка	Пипер Срещу Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) – внося се във фаза ВВСН 51- 89 (първо съцветие, изправена пъпка - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	О	3 дни
80-100 мл продукт /дка	Минимална употреба Райска ябълка Срещу Mucosphaerella pawae – внося се във фаза ВВСН 60-69 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	-
80-100 мл продукт /дка	Минимална употреба Артишок Срещу Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) – внося се във фаза ВВСН 41- 55 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	7 дни
80-100 мл продукт /дка	Минимална употреба Броколи Срещу Мана (<i>Peronospora parasitica</i>) – внося се във фаза ВВСН 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е	П	14 дни

			достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка		
	80-100 мл продукт /дка	Минимална употреба Карфиол Срещу Мана (<i>Peronospora parasitica</i>) – внося се във фаза ВВСН 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	14 дни	
	80-100 мл продукт /дка	Минимална употреба Патладжан Срещу Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) – внося се във фаза ВВСН 51- 89 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	3 дни	
	80-100 мл продукт /дка	Минимална употреба Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква) Срещу Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) – внося се във фаза ВВСН 51- 89 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	3 дни	
	80-100 мл продукт /дка	Минимална употреба Маруля, полска салата, ескариол (широколистна ендевия), кресон, земен кресон, аругула (рукола), червен синап, листа и стъбла от род <i>Brassica</i>, включително от ряпа Срещу Мана (<i>Bremia lactucae</i>) – внося се във фаза ВВСН 41-48	П	7 дни	

				Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЛЕГАДО за вредител или група вредители, с които се води борба от Приложение № 2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЛЕГАДО за контрол на за вредител или група вредители, с които се води борба от Приложение № 2 е на лицето, прилагащо продукта.				
147.	ЛИМОЦИД Вивагро Технопол Монтескьо, Франция Разрешение № 01834-ПРЗ-1/07.04.2020 г. Заповед № РД 11-767 от 25.03.2020 г.	портокалово масло - 60 г/л	400 мл продукт/дка	Зеле Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден	непрофесионална	Sp8 - Опасен за пчелите
			200 мл продукт/дка	Зеле Срещу Белокрылки – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			800 мл продукт/дка	Краставици Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-49 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен	П/О	1 ден		