				Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка				
	ДИАГОНАЛ Албоу ТКИ д.о.о., Словения Разрешение №01668-ПРЗ-2/02.10.2023 г. Заповед №РД 11-346/15.02.2019 г. Заповед №РД11-2186/21.09.2023	азоксистробин – 250 г/л	Продуктът е с идентичен на ПРЗ ЛЕГАДО Разрешение №01601-ПРЗ-2/30.06.2023 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.				непрофесионална	
67.	**ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М/ РАНКОНА НЕО** Синджента България ЕООД Разрешение № 01036-ПРЗ-6/22.11.2023 г. Заповеди № РД 09-791/28.12.2002 г. Заповеди №РД 12-62/29.12.2006 г. Заповед № РД 11-1217/11.11.2013 г. Заповед №РД 11-1657/06.11.2015 г. Заповед №РД 11-2232/05.11.2018 г Заповед №РД РД11-1360/07.06.2023 г. Заповед №РД11-2597/07.11.2023	30 г/л дифеноконазол	150м л/100 кг семена 167-200 мл /100 кг семена 187,5 – 200 мл /100 кг семена	**Пшеница** Твърда главня *(Tilletia caries)* и Фузарийно кореново гниене *(Fusarium spp.)* Вджуджаваща главня *(Tilletia controversa),* -Праховита главня *(Ustilago segetum var. tritici)* Септориоза *(Leptosphaeria nodorum)*		-	втора професионална	със системно действие
			150 мл/100 кг семена	**Ръж** Фузарийно кореново гниене *(Fusarium spp.)* Стъблена главня *(Urocystis occulta)*				
68.	**ДИМИКС 500 СК** Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия Разрешение № 01331 – ПРЗ-3/19.01.2022 г. Заповед №РД 11-1107/24.06.2015 г. Заповед РД 11-1490 /30.07.2019 г. Заповед №РД 11-3176 от 31.12.2021 г.	диметоморф – 500 г/л	30-36 мл/дка	**Картофи** Внася се във фаза BBCH 11-89 Разтваряне на първите листа на главното стъбло – плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват Мана (*Phytophthora infestans*)	П	Картофи-7 дни Лозя -28 дни	първа професионална	
			34 мл/дка	**Лозя** Внася се във фаза BBCH 53-79 Съцветията се виждат изцяло – повечето зърна се събират, грозда се затваря Мана (*Plasmopara viticola*) Прилага се в резервоарна смес с				

				Интервал между приложенията – 10-12 дни Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка Домати само за прясна консумация				
			200 мл/дка	**Пипер** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) – внася се във фаза BBCH 60-89 (първо съцветие - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-12 дни Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка	О	3 дни		
145.	**ЛЕГАДО** Албоу ТКИ д.о.о., Словения Разрешение №01601-ПРЗ-2/30.06.2023 г. Заповед №РД 11-1262/12.07.2018 г. Заповед №РД11-2402/02.11.2022 г. Заповед № РД11-1351/07.06.2023 г.	азоксистробин - 250 г/л	80 мл/продукт/дка	**Краставици, корнишони, тиквички** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) –внася се във фаза BBCH 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложения – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	1 дни	втора професионална	със системно действие
			80 мл/продукт/дка	**Пъпеши, тикви, дини** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) - –внася се във фаза BBCH 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложения – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	3 дни		
			80-100 мл/продукт/дка	**Домати** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) - –внася се във фаза BBCH 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложения – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	3 дни		

100 мл/продукт/дка	**Пшеница (зимна и пролетна)** Срещу Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*), ръжда (*Puccinia* spp.), листни петна (септориоза) (*Septoria tritici*), фузариоза (*Fusarium* spp.) – внася се във фаза BBCH 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни
100 мл/продукт/дка	**Ечемик (зимен и пролетен)** Срещу Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*), ръжда (*Puccinia* spp.), листен пригор (*Rhynchosporium secalis*), хелминтоспориоза (*Helminthosporium* spp.) – внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни
100 мл/продукт/дка	**Ориз** Срещу пирикулариоза (*Pyricularia oryzae*), хелминтоспориоза (*Helminthosporium spp.*) – внася се на пролет BBCH 43-87 (средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восъчна зрелост (твърда консистенция)) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	28 дни
50 мл продукт /дка	**Картофи** Срещу Алтернария (*Alternaria solani*) – внася се във фаза BBCH 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 mm) от първото съцветие (главно	П	7 дни

	стъбло) - плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка		
80-100 мл продукт /дка	**Зрял грах, зелен грах (зърна), зелен грах (шушулки)** Срещу Аскохитоза (Ascochyta pisi), ръжда (Uromyces pisi) – внася се във фаза BBCH 17-72 (7 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 7 мустачета - 20 % от шушулките са достигнали типична дължина) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка	П	14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива
80-100 мл продукт /дка	**Бакла** Срещу Аскохитоза (*Ascochyta fabae*), Ръжда (*Uromyces* sp.*)* – внася се във фаза BBCH 20-79 (няма странични разклонения - почти всички бобове са достигнали крайна дължина) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка	П	14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива
80-100 мл продукт /дка	**Зелен фасул** Срещу Аскохитоза (Ascochyta fabae), Ръжда (Uromyces sp.) – внася се във фаза BBCH 20-79 (няма странични разклонения - чушки: отделни фасулиеви зърна се виждат лесно) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни	П	14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива

	Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка		
100 мл продукт /дка	**Маслодайна рапица** Срещу Алтернария (Alternaria sp.) – внася се във фаза BBCH 60-67 (отворени първите цветове - прецъфтяване: по-голяма част от венчелистчетата окапали) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	21 дни
80-100 мл продукт /дка	**Пипер** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) – внася се във фаза BBCH 51-89 (първо съцветие, изправена пъпка - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	О	3 дни
80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Райска ябълка** Срещу Mycosphaerella nawae – внася се във фаза BBCH 60-69 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	-
80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Артишок** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) – внася се във фаза BBCH 41-55 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	7 дни
80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Броколи** Срещу Мана (*Peronospora parasitica*) – внася се във фаза BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е	П	14 дни

				достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка				
			80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Карфиол** Срещу Мана (*Peronospora parasitica*) – внася се във фаза BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	14 дни		
			80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Патладжан** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) – внася се във фаза BBCH 51-89 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	3 дни		
			80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква)** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) – внася се във фаза BBCH 51-89 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	3 дни		
			80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Маруля, полска салата, ескариол (широколистна ендевия), кресон, земен кресон, аругула (рукола), червен синап, листа и стъбла от род *Brassica*, включително от ряпа** Срещу Мана (*Bremia lactucae*) – внася се във фаза BBCH 41-48	П	7 дни		

				Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЛЕГАДО за вредител или група вредители, с които се води борба от Приложение № 2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЛЕГАДО за контрол на за вредител или група вредители, с които се води борба от Приложение № 2 е на лицето, прилагащо продукта.				
146.	**ЛИМОЦИД** Вивагро Технопол Монтескьо, Франция Разрешение № 01834-ПРЗ-1/07.04.2020 г. Заповед № РД 11-767 от 25.03.2020 г.	портокалово масло - 60 г/л	400 мл продукт/дка	**Зеле** Срещу Трипси – внася се във фаза BBCH 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден	непрофесионална	**Spe8** - Опасен за пчелите
			200 мл продукт/дка	**Зеле** Срещу Белокрилки – внася се във фаза BBCH 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			800 мл продукт/дка	**Краставици** Срещу Трипси– внася се във фаза BBCH 12-49 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен	П/О	1 ден		