

			30-40 мл продукт/дка	Минимална употреба Сорго Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-16 (Разтваряне на втори лист-разтваряне на шести лист) Забележки: БАБХ не носи никаква отговорност при евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето прилагашо продукта.	П	-		
72.	ДИВА Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01638- ПРЗ-3/14.07.2023 г. Заповед №РД 11- 2085/22.10.2018 г. Заповед №РД 11-2247 от 07.11.2018 г. Заповед №РД 11-569 от 28.03.2022 г. Заповед № РД 11- 1651/10.07.2023 г.	пиридат - 600 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ОНИКС с Разрешение № 01585-ПРЗ-3/26.01.2022 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита			втора професионална	с несистемно действие	
73.	ДИКАРИНИ Шарда Кропкем Испания С.Л. Разрешение № 01648- ПРЗ-1/06.12.2018 г. Заповед №РД 11- 2364/22.11.2018 г. Заповед №РД 11-51 от 06.01.2020 г.	дикамба - 550 г/кг никосулфурон - 92 г/кг римсулфурон - 23 г/кг	Продуктът е идентичен на ПРЗ РИНИДИ ВГ с Разрешение № 01584-ПРЗ-1/05.06.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита			втора професионална		
74.	ДИКОПУР Ф/ ХЕРБОКСОН ТОП	2,4 Д – 600 г/л	125 мл/дка	Зимни и пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик) Срещу едногодишни и многогодишни	П	-	втора професионална	със системно действие

			500 мл/дка	Минимална употреба Зимна ръж, Тритикале, Спелта Срещу житни и широко-листни плевели – внося се до ВВСН 29 (край на братенето) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-45 л/дка	П	-		
			200 – 500 мл/дка	Минимална употреба Далматинска хризантема (<i>Tanacetum cineraiifolium</i>) Срещу житни и широко-листни плевели – внося се във фаза ВВСН 12 - 16 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-45 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита РОКСИ 800 ЕК при минимални употреби	П	-		
260.	РИНИДИ ВГ Шарда Юръп Б.В.Б.А Разрешение № 01584- ПРЗ-1/05.06.2018 г. Заповед №РД 11- 927/30.05.2018 г. Заповед №РД 11- 2637/17.12.2019 г.	дикамба - 550 г/кг никосулфурон - 92 г/кг римсулфурон - 23 г/кг	44 г продукт/дка	Царевича Срещу широколистни и житни плевели – внося се във след поникване ВВСН 13-19 (разтворен 3-ти лист- разтворен 9-ти лист) Брой мин/макс приложения -1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да се използва не-йонен адювант 0.1% Продуктът да не се прилага при сладка царевича и при царевича за семепроиз- водство.	-	-	втора професионална	
261.	САЛТУС Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия Разрешение № 01958- ПРЗ-2/12.11.2021 г. Заповед №РД 11-1285 от 18.06.2021 г. Заповед № РД 11-2621 от 04.11.21	имазамокс (кандидат за замяна) – 80 г/л	50 - 65 мл/дка	Соя Срещу житни и широколистни плевели – внося се във фаза ВВСН 12-14 (разтваря се трилистник на 2-ри възел – разтваря се трилистник на 4-ти възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			50-65 мл продукт/ дка	Слънчоглед (Хибриди слънчоглед, толерантни на хербициди съдържащи имидазолинони)				