

	Заповед № РД11-1020/04.05.2023		10-20 мл/дка	Листни зеленчуци (маруля и други салати, спанак, манголд, тученица и пресни билки) Срещу Памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) – внася се във фаза Първа обработка следва да се извърши непосредствено преди първите ларви да се излюпят от яйцата Брой мин/макс приложения – 1-12 Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка Пръскане вечер; 2 до 3 третираня за поколение; Макс. 240 мл/дка за вегетационен период	П/О	-		
			10-20 мл/дка	Декоративни цветя и храсти Срещу Памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) – внася се във фаза Първа обработка следва да се извърши непосредствено преди първите ларви да се излюпят от яйцата Брой мин/макс приложения – 1-12 Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка Пръскане вечер; 2 до 3 третираня за поколение; Макс. 240 мл/дка за вегетационен период	П/О	-		
			10-20 мл/дка	Ягоди Срещу Памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) – внася се във фаза Първа обработка следва да се извърши непосредствено преди първите ларви да се излюпят от яйцата Брой мин/макс приложения – 1-12 Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка Пръскане вечер; 2 до 3 третираня за поколение; Макс. 240 мл/дка за вегетационен период	П/О	-		
89.	МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия Разрешение № 0096-ПРЗ-6/30.11.2023 г. Заповед №РД 11-1114 от 31.05.2021 г. Заповед №РД 11-2686 от 11.11.2021 г. Заповед № РД 11-115/18.01.2023 г. Заповед № РД11-2587/07.11.2023 г.	гау-флувалинат - 240 г/л	20 мл продукт /дка	Пшеница Срещу Вредна житна дървеница (<i>Eurogaster integriceps</i>) Обикновена житна пиявица (<i>Oulema melanopus</i>) Овесена листна въшка (<i>Sitobion avenae</i>), брястова листна въшка (<i>Rhopalosiphum padi</i>), пшеничена галица (<i>Contarinia tritici</i>), галица (<i>Sitodiplosis mosellana</i>), житна цикада (<i>Psammotettix alienus</i>), остроглава житна дървеница (<i>Aelia rostrata</i>), мавърска житна дървеница (<i>Eurygaster maura</i>)– внася се във фаза ВВСН 21-75 (начало на братене - средата на млечна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни	втора професионална	с несистемно действие
			20 мл продукт /дка	Ечемик, овес, ръж, тритикале Срещу Овесена листна въшка (<i>Sitobion avenae</i>), брястова листна въшка (<i>Rhopalosiphum padi</i>), пшеничена галица (<i>Contarinia tritici</i>), галица (<i>Sitodiplosis mosellana</i>), житна цикада (<i>Psammotettix alienus</i>), остроглава житна дървеница (<i>Aelia rostrata</i>), мавърска житна дървеница (<i>Eurygaster maura</i>) – внася се във фаза ВВСН 10-75 (първи лист от колеоптила - средата на млечна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	30 дни		
			20 мл продукт /дка	Маслодайна рапица (зимна и пролетна) Срещу Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>), Рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceutorhynchus napi</i>), Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-54 (разтворен трети лист – видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени	П	30 дни		

				Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка				
	20 мл продукт /дка			Маслодайна рапица (зимна и пролетна) Срещу Зелена листна въшка (<i>Brevicoryne brassicae</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) – внася се във фаза Зимна маслодайна рапица: BVCH 10-57 (напълно оформени котиледони- видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване)) Пролетна маслодайна рапица: BVCH 31-57 (видимо нарастване на първо междувъзлие- видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване)) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
	20 мл продукт /дка			Захарно цвекло Срещу Черна бобова листни въшки (<i>Aphis fabae</i>) – внася се във фаза BVCH 15-39 (разлистени 5 листа – листата покриват 90 % от повърхността) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	14 дни		
	30 мл продукт /дка			Фасул, бакла и грах (зелени без шушулки) Срещу Зелена грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>), трипс (<i>Thrips angusticeps</i>), тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>), грахова галица (<i>Contarinia pisi</i>) – внася се във фаза BVCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиledonите пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период)) за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	7 дни		
	30 мл продукт /дка			Зрял фасул, леша, нахут, посевно секирче (<i>Lathyrus sativus</i>) и грах (варива) Срещу Зелена грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>), трипс (<i>Thrips angusticeps</i>), тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>), грахова галица (<i>Contarinia pisi</i>) – внася се във фаза BVCH 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	14 дни		
	30 мл продукт /дка			Моркови, червено цвекло Срещу <i>Cavariella aegopodii</i> , зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), <i>Semiaphis dauci</i> – внася се във фаза BVCH 10-49 (котиledonите напълно разтворени; точката на нарастване или първи несъщински лист видими - край на нарастването на корена: достигнати типичните форма и размер) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	14 дни		
	30 мл продукт /дка			Артишок, кардун Срещу Листни въшки (<i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis solanella</i> , <i>Capitophorus horni</i> , <i>Brachycaudus cardui</i>), трипси (<i>Thrips</i> sp.), ношенки (<i>Spodoptera</i> sp.) – внася се във фаза BVCH 15-49 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	7 дни		
	30 мл продукт /дка			Карфиол, главесто зеле и брюкселско зеле Срещу Зелена листна въшка (<i>Brevicoryne brassicae</i>), зелена прасковена листна въшка	П	7 дни		

				(<i>Myzus persicae</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), бели зелеви пеперуди (<i>Pieris sp.</i>), зелева ношенка (<i>Mamestra brassicae</i>) – внася се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка				
		40 мл продукт /дка		Маруля и други подобни (маруля, бейби маруля) Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), листни въшки (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Uroleucon cichorii</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-41 (разтворен втори същински лист-образувана 10% от листната маса, характерна за вариетета) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П	14 дни		
		20 мл продукт /дка		Патладжан Срещу Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), листни въшки (<i>Macrosiphum sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-75 (трети същински лист-пети плод с типичен размер и форма) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс –15-50 л/дка	П	3 дни		
		20 мл продукт /дка		Краставици, корнишони, тиквички Срещу Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), листни въшки (<i>Macrosiphum sp.</i>), калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>) – внася се във фаза ВВСН 15-84 (пети лист разтворен – 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс –20-100 л/дка	П	7 дни		
		20 мл продукт /дка		Краставици, корнишони, тиквички Срещу Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>) – внася се във фаза ВВСН 15-84 (пети лист разтворен - 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	7 дни		
		30 мл продукт /дка		Пъпеш Срещу Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), листни въшки (<i>Macrosiphum sp.</i>), калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>) – внася се във фаза ВВСН 15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен- пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	7 дни		
		20-60 мл продукт /дка		Ябълка, круша, дюля, мушмула Срещу Плодова корогризачка (<i>Adoxophyes orana</i>), кафява мраморна дървеница (<i>Halyomorpha halys</i>) – внася се във фаза ВВСН 52-59 (край на набъбването-повечето цветове с венчелистчета оформят кука топка) ВВСН 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следлъфтежно окапване-размер на плода до 40 mm; изправяне на плода) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	30 дни		
		20-60 мл продукт /дка		Ябълка, круша, дюля, мушмула Срещу ябълково-живовлекава листна въшка (<i>Dysaphis plantaginea</i>), зелена ябълкова листна въшка (<i>Aphis pomi</i>), <i>Contarinia pyrivora</i> , <i>Dasineura pyri</i> – внася се във фаза ВВСН 00/01-81 (покой: листните пъпки и по – дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи/начало на набъбване на листните пъпки - начало на узряване: първа поява на специфично за сорта опцветяване)	П	30 дни		

				Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка			
		20-60 мл продукт /дка	Праскова, кайсия, нектарина Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella), източен плодов червей (Cydia molesta), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), Трипси (Thrips sp.) - ВВСН 53-59 (отваряне на пълките; люспите са отворени , виждат се светлозелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон) ВВСН 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка 40-120 мл продукт /100 л вода	П	30 дни		
		20-60 мл продукт /дка	Праскова, кайсия, нектарина Срещу Листни въшки (Hyalopterus amygdali, Myzus persicae, Brachycaudus persicae) – внася се във фаза ВВСН 01-59 (начало на събуждането (набъбването) на пълките-повечето цветове с венчелистчета та са оформени като топчици (бял бутон)) ВВСН 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	30 дни		
		30 мл продукт /дка	Лозя (грапезни и винени сортове) Срещу Лозова цикада (Empoasca vitis), американска лозова цикада (Scaphoideus titanus), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), лозов трипс (Drepanothrips reuteri) – внася се във фаза ВВСН 53-79 (съцветията се виждат изцяло-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка 30-300 мл продукт /100 л вода	П	21 дни		
		30 мл продукт /дка	Люцерна Срещу Грахова листна въшка (Acyrtosiphon pisum), черна бобова листна въшка (Aphis fabae), малък люцернов листен хоботник (Hypera postica), ивичест грудков хоботник (Sitona lineatus), детелинов хоботник (Apion pisi), люцернов листояд (Phytodecta fornicata), жълт люцернов тихиус (Tychius flavus) – внася се във фаза ВВСН 12-72 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка Да не се прилага по време на цъфтеж	П	7 дни		
		20-25 мл продукт /дка	Череша Срещу Черешова муха (Rhagoletis cerasi) – внася се във фаза ВВСН 71-81 (разрастване на яйчника; окапване на завързите след цъфтеж-начало на оцветяване) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Не повече от две третириания за вегетационен сезон	П	14 дни		
		25 мл/дка	Череша Срещу Ябълков златист хоботник (Rhynchites bacchus) – внася се във фаза ВВСН 15-39 (5 листа разтворени-леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Не повече от две третириания за вегетационен сезон	П	14 дни		
		20 мл/дка	Слънчоглед Малка сливова листна въшка (Brachycaudus helichrysi) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни	П	60		

				Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
		40 мл продукт /дка	Цитрусови култури Срещу Листни въшки (<i>Aphis sp.</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>) цитрусов молец (<i>Prays citri</i>) – внася се във фаза ВВСН 01-59 (начало на набъбване на пъпките – повечето цветове формират куха топка) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка 20-40 мл продукт /100 л вода		П	30 дни		
		30 мл/дка	Минимална употреба Фасул, бакла, грах (зелени, без шушулки) Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>)– внася се във фаза ВВСН 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период)) за бакла (поникване: кълът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовите са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка		П	7 дни		
		30 мл/дка	Минимална употреба Зрял фасул, нахут, посевно секирче (<i>Lathyrus sativus</i>), грах (варива) Срещу Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка		П	14 дни		
		40 мл/дка	Минимална употреба Компасна салата, ескарол, манголд – срещу Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), листни въшки (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Uroleucon cichorii</i>), трипси (<i>Thrips sp.</i>), растителноядни дървеници (<i>Lygus sp.</i>), бели зелеви пеперуди (<i>Pieris sp.</i>), зелева ношенка (<i>Mamestra brassicae</i>), листоминиращи мухи (<i>Liriomyza sp</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист- формирана цялата листна маса) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка		П	14		
		20 мл/дка	Минимална употреба Патладжан Срещу Калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), ношенки (<i>Spodoptera sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-75 (трети същински лист-пети плод с типичен размер и форма) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-50 л/дка		П	3		
		20-60 мл/дка	Минимална употреба Ябълка Срещу Пъстър миниращ молец (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), ябълков молец (<i>Yponomeuta malinellus</i>), бяла американска пеперуда (<i>Hyphantria cunea</i>), листни бълхи (<i>Cacopsylla sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 52-59, ВВСН 71-74 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка		П	30		
		20-60 мл/дка	Минимална употреба Круша, дюля, мушмула Срещу Пъстър миниращ молец (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>), ябълков молец (<i>Yponomeuta malinellus</i>), бяла американска пеперуда (<i>Hyphantria cunea</i>), листни бълхи (<i>Cacopsylla sp.</i>) – внася		П	30		

			се във фаза ВВСН 52-59, ВВСН 71-74 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка			
	20-60 мл/дка	Минимална употреба Праскова, кайсия, нектарина Срещу Средиземномор-ска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) – внася се във фаза ВВСН 53-59 (отваряне на пъпките:люспи те са отворени виждат се светложелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон)) ВВСН 71-73 (разрастване на яйчника окапване на завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка 40-120 мл продукт/100 л вода Да не се надвишава дозата от 60 мл/дка	П	30		
	30 мл/дка	Минимална употреба Ягоди Срещу Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), калифорнийски трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), нощенки (<i>Spodoptera</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 15 - 81 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	7		
	30 мл/дка	Минимална употреба Люцерна Срещу Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-72 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	7		
	25 мл/дка	Минимална употреба Череша Срещу Калифорнийска щитососна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), Черничева щитососна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>), Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фаза ВВСН 01-81 (начало на събуждането (набъбване) на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлоцветени краища - начало на оцветяване) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка Да не се надвишава дозата от 25 мл/дка Не повече от две третириания за вегетационен сезон	П	14		
	20-25 мл/дка	Минимална употреба Череша Срещу Листни въшки (<i>Myzus</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 15-39 (пет листа разтворени-леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Да не се надвишава дозата от 25 мл/дка Не повече от две третириания за вегетационен сезон	П	14		
	40 мл/дка	Минимална употреба Черупкови овощни видове: бадеми, шамфъстък, леска, кестен Срещу Листни въшки: прашеста прасковена листна въшка (<i>Hyalopterus amygdali</i>) <i>Brachycaudus amygdalinus</i> <i>Eurytoma amygdali</i> Цикади: <i>Empoasca</i> sp. <i>Jacobiasca formosana</i> . <i>Jacobiasca lybica</i> , <i>Monosteira uncostate</i> , лешников хоботник <i>Curculio nucum</i> , <i>Gonocerus acuteangulatus</i> – внася се във фаза ВВСН 51-79 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	28		

			40 мл/дка Минимална употреба Орех Срещу Цикади: <i>Empoasca</i> sp. <i>Jacobiasca formosana</i>. <i>Jacobiasca lybica</i> <i>Gonocerus acuteangulatus</i> – внася се във фаза ВВСН 51-79 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	28			
			40 мл/дка Минимална употреба Декоративни видове Листни въшки (<i>Aphididae</i>), трипси (<i>Thripidae</i>), щитососни въшки,пълзящи насекоми, видове от род <i>Lepidoptera</i>, листни цикади, акари, видове от род <i>Coleoptera</i>, белокрилки, мухи – внася се във фаза ВВСН 24-69 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка 40-80 мл продукт/100 л вода Да не се надвишава дозата от 40 мл/дка	П	-			
Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при при минимални употреби. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при минимални употреби в е на лицето прилагащо продукта.								
90.	МАГТОКСИН ПЕЛЕТА Деция Фрайберг ГмбХ, Германия Разрешение№01825-ПРЗ-1/06.03.2020 г. Заповед №РД 11-580/26.02.2020 г.	магнезиев фосфид 660 г/кг	25 пелети/м³ (=5 г РН₃/м³)	Зърнено-житни (зърно при съхранение) Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>),молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>),ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>),брашнени бръмбари(<i>Tenebriosp.</i>), брашнен акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus</i> sp. Брой мин/макс приложения – 1	3	Зърнено-житни култури – 14 дни; всички останали – 7 дни	първа професионална	Между 3-5 дневна експозиция