

				Внася се есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 25-50 л/дка				
			10 г/дка	Мека пшеница, Твърда пшеница Ечемик Разтворени две листа-край на братенето (ВВСН 12-29) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка				
88.	ЕКОПАРТ ТУРБО Ничино Юрп Ко Лтд. Обединено кралство Разрешение № 01387 – ПРЗ–1/25.03.2016 г. Заповед № РД 11- 398/16.03.2016 г.	пирафлуфен-етил 26,5 г/л	80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лозя Внася се във фаза ВВСН 19-75 Девет и повече листа са отворени- гроздовите зърна са с размер на грахово зърно Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с съдържащи хербициди Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни		Лозя ,Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула, Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива – 30 дни; Череша – 7 дни; Лешник - 20; Картофи -3 дни; Свободни площи Железопътни линии Канални диги Сухи канавки -	втора професионална	
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни				
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си азмер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2				

				Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни				
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Череша Срещу широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (ВВСН 51-75) Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер				
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лешник Срещу широколистни плевели, Коренови издънки Срещу в комбинация с глифозат съдържащи хербициди Внася се във фаза (ВВСН 13-76) Развитие на листата-плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни				
			80 мл/дка	Картофи Срещу Листна десикация Внася се във фаза (ВВСН 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си тегло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни				
			25-30 мл/дка	Свободни площи Железопът-ни линии Канални диги Сухи канавки Широколистни плевели, Коренови издънки Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни				
89.	ЕКСПЕРТ ВГ Асценза Агро С.А., Португалия Разрешение № 01588-ПРЗ- 1/05.06.2018 г.	Трибенурон метил 750 г/кг	1.5-2 г/дка	Пшеница ечемик, овес Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-29 (трети лист-край на братене)		-	непрофесионална	със системно действие