			200 продукт/ дка	**Ягоди** Срещу Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis),* трипси *(Thrips sp.),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* нощенки от род Spodoptera, петнистокрила дрозофила *(Drosophila suzukii)* – внася се във фенофаза BBCH 11-89 (Първи развит лист - втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения –3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	О	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	**Домат патладжан** Срещу Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis),* трипси *(Thrips sp.),* Разред Lepidoptera *(*памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* нощенки от род Spodoptera, доматен миниращ молец *(Tuta absoluta)*- внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	**Домат патладжан** Срещу Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis),* трипси *(Thrips sp.),* Разред Lepidoptera *(*памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* нощенки от род Spodoptera, доматен миниращ молец *(Tuta absoluta))*- внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения –1 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка	О	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	**Пъпеш, Диня, Тиква** Срещу Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis),* трипси *(Thrips sp.),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* нощенки от род Spodoptera – внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка	П	3 дни		
			200-240 мл продукт/ дка	**Пъпеш, Диня, Тиква** Срещу Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis),* трипси *(Thrips sp.),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* нощенки от род Spodoptera– внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения –3 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка	О	3 дни		
58.	**ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК** Асценза Агро СА, Португалия Разрешение № 01889-ПРЗ-1/22.10.2020 г.	пирипроксифен - 100 г/л	28-50 мл продукт /дка	**Семкови овощни видове (Ябълки, круши)** Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus*) – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка	П	-	втора професионална	**SPe8-**Опасен за пчелите

	Заповед №РД 11-2404 от 21.10.2020 г.		28-50 мл продукт /дка	**Костилкови овощни култури (Сливи, череши, кайсии, нектарини, праскови)** Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus*) – – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка	П	-		
			50-80 мл продукт /дка	**Домати** Белокрилки (*Bemisia tabaci, Trialeurodes sp.)* – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка Да не се надвишава общото количество от 125 мл продукт/дка за вегетационен период	О	3 дни		
			25-112,5 мл продукт /дка	**Цитрусови култури (портокали, лимони, лайм, грейпфрут и тангерини)** Щитоносни въшки (*Aonidiella sp., Aspidiotus sp., Saissetia sp., Lepidosaphes beckii, Parlatoria pergandei*) – внася се Май-юни Август-септември Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	30 дни		
59.	**ЕЛЕКТИЦИД** Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 02056-ПРЗ-1/16.11.2022 г. Заповед №РД11-2415/02.11.2022 г.	бифеназат - 240 г/л	40 мл продукт/дка	**Украсни култури (неядливи)** Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*) Белокрилки (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	О	-	втора професионална	инсектицид/акарициди с несистемно действие **Spe8** - Опасен за пчелите
60.	**ЕРАДИКОТ МАКС** Сертис Белхим Б.В., Нидерландия Разрешение № 01740-ПРЗ-3/03.04.2023 г. Заповед №РД 11-1449/25.07.2019 г. Заповед №РД 11-1338 от 23.06.2020 г. Заповед № РД 11-109/18.01.2023 г. Заповед № РД11-541/09.3.2023 г.	малтодекстрин - 476 г/л	4-6 л продукт /дка	**Всички ядливи и неядливи култури** Срещу Обикновен паяжинообразуващакар (*Tetranychus urticae)*, Белокрилки (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* – внася се във всички фази на развитие Брой мин/макс приложения – 1-20 Интервал между приложеията – 3 Вода л/дка мин/макс – 20-300 л/дка Препоръчва се 20 мл продукт на литър вода	О	-	втора професионална	**Spe8** - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Не използвайте там, където пчелите активно търсят храна. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност С несистемно действие
			1,5-3 л продукт /дка	**Круши** Срещу Обикновена крушова листна бълха (*Cacopsylla pyri*) – внася се във фаза BBCH 69-89 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали - консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост). При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложеията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка 1.5-2 л продукт/100 л вода	П			
			0.5-2.25 л продукт /дка	**Лозя (десертни сортове)** Срещу Щитоносни въшки – внася се във фаза BBCH 69-89 (край на цъфтежа - плодът е готов за беритба) При първа поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложеията – 5 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка 1-1.5 л продукт/100 л вода	П			
			0.5-2.25 л продукт /дка	**Лозя** Срещу Акари *(Eryophiide)* – внася се във фаза BBCH 01-53 (начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разраства вътре в обвивката - съцветията се виждат изцяло)	П			

*