

	Заповед №РД 11-918/30.05.2018 г. Заповед № РД11-103/18.01.2023 г.			Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 35-70 мл/дка				
90.	ЕКСПРЕС 50 СГ/ ФЛУЕНС СХ ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 0567-ПРЗ-2/12.03.2018 г. Заповед № РД 12-62/29.12.2006 г. Заповед №РД 11-395/01.03.2018 г. Заповед №РД 11-1268 от 04.07.2019 г. Заповед №РД11-2151/30.09.2022 г.	500 г/кг трибенурон-метил	4 г/дка с 20-30 л/дка раб. р-р	Слънчоглед Срещу широколистни плевели (слънчогледови хибриди, устойчиви на Експрес 50 СГ) Срещу широколистни плевели - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка		30 дни	втора професионална	
91.	ЕКСТЕНКОР ОД Аспенса Агро С.А., Португалия Разрешение №01673-ПРЗ-1/26.02.2019 г. Заповед №РД 11-353/15.02.2019 г.	никосулфурон - 20 г/л сулкотрион – 150 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ СУВЕРЕН ОД с Разрешение № 01556-ПРЗ-1/12.03.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.				втора професионална	
92.	ЕЛЕКТРОН 500 СК Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия Разрешение № 01300–ПРЗ-2/09.04.2024 г. Заповед №РД 11-2533/11.12.2018 г. Заповед № РД11-871/04.04.2024 г.	квинмерак 125 г/л метазахлор 375 г/л	200 мл/дка	Маслодайна рапица Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след сеитба преди поникване или вегетационно от фено фаза „разтворен втори лист“ до „разтворен четвърти лист“ на културата (ВВСН 12-14) Брой мин/макс приложения - 1	П	-	втора професионална	със системно действие
93.	ЕЛТИВИС Агрия АД Разрешение № 02024-ПРЗ-2/09.04.2024 г. Заповед №РД 11-924 от 13.05.2022 г.	флуроксипир (флуохурур) - 250 г/л	60-80 мл продукт/дка	Зимна пшеница, зимен ечемик Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворени- флаговият лист е напълно разтворен) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие

	Заповед № РД11-899/08.04.2024 г.		80 мл продукт/ дка	Царевича- ZEAMX Широколистни плевели (3DICOT) – внося се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист-разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П			
			60 мл продукт/ дка	Минимална употреба Полски мак-PAPRH Широколистни плевели (3DICOT) – внося се във фаза ВВСН 16-19 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да не се използва за консумация от хора или животни. Използва се само като украса и за производство на масло от маково семе за производство на сапун, бои и лакове. Забележки: Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при минималните употреби. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при минималните употреби.	П			
94.	ЕЛУМИС ОД Синджента България ЕООД Разрешение № 1151-ПРЗ- 3/14.09.2021 г. Заповед №РД 11- 528/03.05.2012 г. Заповед №РД 11- 1074/14.10.2013г. Заповед №РД 11-1933 от 23.08.2021 г.	75 г/л мезотрион + 30 г/л никосулфурон	130-200 мл продукт/дка еднократно	Царевича Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур от семена и коренища – внося се във фаза ВВСН 12-17 (2-ри до 7-ми разтворен лист на културата; до 1-3 лист на житните плевели; 10-20 см височина на балура или 2-4 лист на широколистните плевели) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да не се прилага при сладка царевича	П	-	втора професионална	със системно действие