

	разпространение и още 12 месеца за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЗУУМ 11 СК етикетирани в съответствие с Разрешение № 01298-ПРЗ Издание: 2/16.06.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ.		12,55-50 мл/дка 30-35 мл/дка 40-50 мл/дка 30-37,5мл/дка 25-50 мл/дка	Домати, Патладжан (оранжерийно и полско производство) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Дини, пъпеши (полско производство) Обикновен паяжинообра-зуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Ягоди (оранжерийно и полско производство) Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Памук Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Декоративни рози Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	П/О П П/О П О	пъпеши – 3дни; Ягоди – 3дни; Памук – 35 дни; Декоративни рози – не се изисква;		
67.	ИКЕБАНА ТРИПЪЛ АКСИОН Ротам Агрокемикъл Юрѓп Лтд, Обединено кралство ОТНЕТО Разрешение № 01752-ПРЗ-1/16.09.2019 г. Заповед № РД 11-1712/20.08.2019 г. Заповед №РД 11-2177/21.09.2023 г. Считано от датата на издаване на настоящата заповед се определят гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ИКЕБАНА ТРИПЪЛ АКСИОН , етикетирани в съответствие с Разрешение № 01752-ПРЗ-Издание: 2/15.06.2021 г.	<u>абамектин</u> 0,015 г/л <u>делтаметрин</u> 0,010 г/л <u>тебуконазол</u> 0,200 г/л	4,484 л продукт/ дка	Декоративни растения (тревисти и дървесни растения) Срещу Листни въшки, гъсеници, акари Брашнеста мана Ръжди – внася се във всяка една фаза на развитие на културата при поява на повреди от неприятеля или симптоми на болестта Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията - 7	3	-	непрофесионална	С комбинирано действие -
68.	ИНАЗУМА Суми Агро Европа Лимитид – клон Германия Разрешение № 2106-ПРЗ-1/17.11.2023 г. Заповед№РД11-2647/08.11.2023 г.	ацетамиприд– 100 г/кг + ламбда-цихалотрин– 30 г/кг (кандидат за замяна)	15 г/дка 20 г/дка 20 г/дка	Пшеница (зимна) Вредна житна дървеница (<i>Eurygaster integriceps</i>), обикновена житна пиявица (<i>Oulema melanopus</i>), листни въшки (<i>Aphis</i> sp.) – внася се във фаза BBCH 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка Царевича Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>), западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) - до BBCH 51 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30 – 50 л/дка Маслодайна рапица (зимна) Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephalus</i>), зелеви бълхи (<i>Phyllotreta</i> sp.) – внася се във фаза BBCH 11-19	П П П	-	втора професионална	със системно и несистемно действие SPe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели.

				(разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка				
			20 г/дка	Маслодайна рапица (зимна) Рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceutorhynchus napi</i>), зелев стъблен скритохоботник (<i>Ceuthorhynchus pallidactylus /quadridens/</i>) Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-50 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия - наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка	П			
			20 г/дка	Минимална употреба Царевича Сив царевичен хоботник (<i>Tanymecus dilaticollis</i>) – внася се до до ВВСН 51 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 14 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П			
			20 г/дка	Минимална употреба Маслодайна рапица (зимна) Рапична листна оса (<i>Athalia rosae</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-19 (разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.	П			
69.	ИНСЕКТОЙЛ КИИ Индустриал Кимика Кий АД, Испания Разрешение № 01613-ПРЗ-1/13.09.2018 г. Заповед № РД 11-1748/29.08.2018 г. Заповед № РД 11-3050 от 14.12.2021 г.	парафиново масло (CAS № 8042-47-5) - 790 г/л	0.375 - 1.5 л продукт /дка	Костилкови овощни видове (кайсии, череши, праскови, нектарини и сливи) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), черничева щитоносна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) – внася се преди ВВСН 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка – 50-150 л/дка	П	-	втора професионална	
			0.375 – 1.5 л продукт /дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, китайска круша – Наши) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се във фаза Брой мин/макс приложения –1 Вода л/дка – 50-150 л/дка	П	-		
70.	ИНФИС Лаинко С.А./Lainco S.A., Испания Разрешение №01713-ПРЗ-1/23.04.2019 г. Заповед № РД 11-768 от 17.04.2019 г.	делтаметрин 25 г/л	50 мл/дка	Патладжан Срещу Листни въшки: Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Зеленоивичеста листна въшка (голяма картофена листна въшка) (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Ноценки: Памукова ноценка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Египетска ноценка (<i>Spodoptera littoralis</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите
			50 мл/дка	Домати Срещу Листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Зеленоивичеста листна въшка (голяма картофена	П/О	3 дни		