			80-100 мл продукт/дка	**Брюкселско зеле** Срещу Черни петна (*Alternaria brassicae/brassicicola*); пръстеновидни петна (*Mycosphaerella brassicicola*) – внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити-достигнат е типичния размер на главата) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 10-14. Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка		14 дни		
			80-100 мл продукт/дка	**Артишок** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*), Мана (*Bremia lactucae*) – внася се във фаза BBCH 10-49 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 7-10. Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка		7 дни		
			80-100 мл продукт/дка	**Аспержи** Срещу Ръжда (*Puccinia asparagi*); стемфилиум (*Stemphylium vesicarium*) – внася се във фаза BBCH 10-93 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 10-14. Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка		-		
91.	**ИКЕБАНА ТРИПЪЛ АКСИОН** РОТАМ КРОП ПРОТЕКШЪН ЮРЪП САС, Франция Разрешение № 01752-ПРЗ-2/15.06.2021 г. Заповед № РД 11-1712/20.08.2019 г. Заповед №РД 11-1156 от 02.06.2021 г.	абамектин 0,015 г/л делтаметрин 0,010 г/л тебуконазол 0,200 г/л	4,484 л продукт/дка	**Декоративни растения (тревисти и дървесни растения)** Срещу Листни въшки, гъсеници, акари Брашнеста мана Ръжди – внася се във всяка една фаза на развитие на културата при поява на повреди от неприятеля или симптоми на болестта Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията - 7	П/ З	-	непрофесионална	със системно и несистемно действие
92.	**ИНВЕСТ** Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания	**Второ търговско име на ИНТЕРЕСТ**						

				Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ИНСИГНИЯ за контрол на болестите дребни листни петна *(Kabatiella zeae)* и хелминтоспориоза *(Cochliobolus carbonum)* при царевица. Отговорността за липса на на каквато и да било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ИНСИГНИЯ за контрол на болестите дребни листни петна *(Kabatiella zeae)* и хелминтоспориоза *(Cochliobolus carbonum)* при царевица е на лицето прилагащо продукта.				
96.	**ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ** Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия	**Второ търговско име на ТАРКЗА 250 ЕВ**						
97.	**ИНТЕРЕСТ/ИНВЕСТ/ПРИНСИПЪЛ** Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания Разрешение № 01443–ПРЗ-4/22.11.2023 г. Заповед №РД 11-1564/29.08.2016 г. Заповед №РД 11-261/07.02.2017 г. Заповед №РД 11-2647/17.12.2019 г. Заповед №РД 11-2957 от 09.12.2021 г. Заповед № РД11-2595/07.11.2023 г.	дифеноконазол – 30 г/л	200 мл/ 100 кг семена	**Пшеница**) Твърда главня (*Tilletia caries*); Праховита главня (*Ustilago tritici*) - внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка		-	втора професионална	със системно действие
			200 мл/ 100 кг семена	**Зимен и пролетен ечемик** Ленточна болест (*Pyrenophora graminea*); Праховита главня (*Ustilago nuda*) - внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка				
98.	**ИНФИНИТО СК** Байер България ЕООД - Удостоверение № 547-ПРЗ - 2/11.08.2014 г. Заповед №РД 11-1939/02.10.2018 г.	625 г/л пропамокарб хидрохлорид+ 62,5 г/л флуопиколид	120-160 мл/дка	**Картофи** Мана (*Phytophthora infestans*)		картофи, салата (на полето) – 7 дни; краставици, тиквички, тикви, пъпеши и дини (на полето), пъпеши и	2	
			120-160 мл/дка	**Краставици, тиквички и тикви (полско производство)** Мана по краставици (*Pseudoperonospora cubensis)*				