101.	**КАЗИНО РОЯЛ** Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 01874-ПРЗ-1/01.09.2020 г. Заповед №РД 11-1906 от 19.08.2020 г.	боскалид - 267 г/кг пираклостробин – 67 г/кг	150 г продукт/дка	**Домати** Срещу Кафяви листни петна (*Alternaria* spp.) – внася се При поява на първи симптоми BBCH 20-87 (формиране на странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П		непрофесионална	със системно и несистемно действие
			150 г продукт/дка	**Минимална употреба** **Патладжан** Срещу Брашнеста мана (*Oidiopsis taurica*) – внася се При поява на първи симптоми BBCH 20-87 (формиране на странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от приложението на КАЗИНО РОЯЛ срещу вредителите при минимална употреба при патладжан.	П	-		
102.	**КАНТУС** БАСФ ЕООД Разрешение № 208-ПРЗ-3/16.09.2019 г. Заповед №РД 09-664/09.12.2004 г.	боскалид -500 г/кг	100 г продукт /дка	**Лозя** Срещу Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* – внася се във фаза BBCH 68-81 (80% опадане на ресите - начало на узряване) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-160 л/дка	П	28 дни	непрофесионална	

	Заповед №РД 11-1213/11.11.2013 г. Заповед №РД 11-1748/22.08.2019 г.		50 г продукт /дка	**Маслодайна рапица** Срещу Склеротиния *(Sclerotiniasclerotiorum)* Алтернария *(Alternaria brassicae)* Фомоза *(Phoma lingam)* – внася се във фаза BBCH 12-79 (разтворен втори лист - почти всички шушулки са оформени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П	35 дни		
103.	**КАПТАН 80 ВГ** Ариста ЛайфСайънс С.А.С, Франция Разрешение № 01376 – ПРЗ-3/01.12.2020 г. Заповед №РД 11-172/02.02.2016 г. Заповед № РД 11-618/19.04.2016 г. Заповед РД 11-1503/30.07.2019 г. Заповед №РД 11-2574 от 17.11.2020 г.	каптан 800 г/кг	150-190 г/дка	**Домати (полско производство)** Внася се при поява на първи симптоми Картофена мана (*Phytophtora infestans*), Сиво гниене (*Botrytis cinerea*), Алтернария (*Alternaria solani)*	-	Домати – 21 дни; Ябълки Круши Дюли Азиатски круши – „Наши” - 28; Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши – 21 дни; Ягоди -14 дни;	втора професионална	
			150-180 г/дка	**Ябълки Круши Дюли Азиатски круши – „Наши”:** Струпясване *(Venturia spp.)* : внася се преди цъфтеж: BBCH 09-69 (зелените връхчета на листата са 5 мм над люспите на пъпките – край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали) Ранно и късно кафяво гниене *(Monillia spp.)* внася се след цъфтеж BBCH 71-89 (размер на завръза до 10 mm;				