

258.	СКАБ 80 ВГ/КАПЕТАН/КАПШЪН Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания Разрешение № 01336-ПРЗ-9/22.11.2023 г. Заповед №РД 11-1245/17.07.2015 г. Заповед №РД 11-632/19.04.2016 г., Заповед №РД 11-1301/19.07.2016 г., Заповед №РД 11-2022/20.10.2016 г., Заповед №РД 11-2404/05.12.2016 г. Заповед №РД 11-1523/31.07.2019 г. Заповед №РД 11-634 от 31.03.2022 г. Заповед №РД 11-1402/09.06.2023 г. Заповед № РД 11-2582/07.11.2023 г.	каптан - 800 г/кг	188 г/ дка	Ябълки, круши Срещу Струпясване (<i>Venturia spp.</i>) Антракноза (<i>Gleosporium spp.</i>) Късно кафяво гниене по плодовете (<i>Monilia fructigena</i>) Нектриален рак (<i>Nectria galligena</i>) (<i>Stemphylium vesicarium</i>) – само по круши – внася се от фаза ВВСН 51 (Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци) Брой мин/макс приложения – 1-7 Интервал между приложенията- 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, Съответно 1052,8 г. каптан/дка	П	21 дни	втора професионална	с несистемно действие
			188 г/дка	Минимална употреба Дюли, мушмули, круши-Наши Срещу Късно кафяво гниене (<i>Monilinia fructigena</i>) – внася се във фаза от ВВСН 51: Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци Брой мин/макс приложения -7 Интервал между приложенията- 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка	П	21 дни		
				Минимална употреба Дюли, мушмули, круши-Наши Срещу Струпясване (<i>Venturia sp.</i>), Антракноза (<i>Gleosporium sp.</i>), Кафяво гниене (<i>Monilia sp.</i>), Сиви петна (<i>Mycosphaerella sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 99-50 (продукцията е прибрана -набъбване на неразцъфналите пъпки)				

	Брой мин/макс приложения -4 Интервал между приложенията- 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка		
188 г/дка	Минимална употреба Дюли Срещу Загиване (мумифициране) завързите на дюлята (<i>Monilinia cydoniae</i>) – внася се във фаза От ВВСН 51: Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци Брой мин/макс приложения -7 Интервал между приложенията- 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка	П	21 дни
188 г/дка	Минимална употреба Круши Срещу Струпяване (<i>Venturia pyrina</i>) – внася се във фаза ВВСН 99-50 продукцията е прибрана – набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка	П	-
188 г/дка	Минимална употреба Круши Срещу Сиви петна (<i>Mycosphaerella sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 99-50 (продукцията е прибрана -набъбване на неразцъфналите пъпки) – внася се	П	21 дни

	във фаза ВВСН 99-50 продукцията е прибрана – набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка		
188 г/дка	Минимална употреба Дюли, мушмули Срещу Късно кафяво гниене (<i>Monilia fructigenae</i>) – внася се във фаза ВВСН 99-00 – продукцията е прибрана – покой Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка	П	-
188 г/дка	Минимална употреба Ябълки Срещу Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>) Черни раковини (<i>Botryosphaeria obtusa</i>) Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i>) – внася се във фаза От ВВСН 99-50 Продукцията е прибрана-набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка Българска агенция по безопасност на	П	-

	храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на СКАБ 80 ВГ/КАПЕТАН при минимални употреби.		
188 г/дка	Минимална употреба Ябълки Срещу Сиви петна (<i>Mycosphaerella</i> sp.) – внася се във фаза от ВВСН 99-50 Продукцията е прибрана-набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци Брой мин/макс приложения – 4 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на СКАБ 80 ВГ/КАПЕТАН при минимални употреби.	П	-
300 г/дка	Минимална употреба Сливи Срещу Къдравост (<i>Taphrina deformans</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-69 (цветните пъпки са затворени, виждат се светлокафяви люспи - край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)); ВВСН 31-50 (начало на развитие на леторастите - цветните пъпки са затворени, виждат се светлокафяви люспи) Брой мин/макс приложения – 4	П	-

	Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на СКАБ 80 ВГ/ КАПЕТАН при минимални употреби.		
180 - 210 г/дка	Минимална употреба Кайсии Срещу Кафяво гниене (<i>Monilia sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 60-69 (първи отворени цветове-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 120 л/дка	П	21 дни
0,2% 50-100 г/дка	Минимална употреба Декоративни растения Листни петна – комплекс от фитопатогенни гъби (ZZYYFF) – внася се във фаза ВВСН 13-69 Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	О	-
0,2% 50-100 г/дка	Минимална употреба Овощни разсадници, декоративни разсадници Листни петна – комплекс от фитопатогенни гъби (ZZYYFF) – внася се във фаза ВВСН ВВСН 13-69 Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита СКАБ 80 ВГ/ КАПЕТАН/ КАПШЪН , съгласно	О	-

				Приложение № 1 от настоящата заповед за контрол на листни петна – комплекс от фитопатогенни гъби при декоративни растения, овощни разсадници и декоративни разсадници. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита СКАБ 80 ВГ/ КАПЕТАН/ КАПШЪН , съгласно Приложение № 1 от настоящата заповед, за контрол на листни петна – комплекс от фитопатогенни гъби при декоративни растения, овощни разсадници и декоративни разсадници, е на лицето прилагащо продукта.				
259.	СКОР 250 ЕК Синджента България ЕООД Разрешение № 01041-ПРЗ-4/26.03.2020 г. Заповед № РД 09-791/28.12.2002 г. Заповед № РД 11-1041/03.06.2019 г. Заповед № РД 11-743 от 20.03.2020 г	250 г/л дифеноконазол	00,02-0,03% (20-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	Праскови Къдравост (<i>Taphrina deformans</i>), брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i> v. <i>persicae</i>) кафяво гниене (<i>Monilia</i> spp.) – внася се във фаза ВВСН 60 (първи отворени цветове) до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-14 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	7 дни	втора професионална	Да се спазва Законът за пчеларството
			0,02-0,03% (20-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	Нектарини Къдравост (<i>Taphrina deformans</i>), брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i> v. <i>persicae</i>) кафяво гниене (<i>Monilia</i> spp.) – внася се във фаза ВВСН 60 (първи отворени цветове) до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-14 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка Да се спазва Законът за пчеларството	П	7 дни		