

	Заповед №РД 11-1213/11.11.2013 г. Заповед №РД 11-1748/22.08.2019 г.		50 г продукт /дка	Маслодайна рапица Срещу Склеротиния (<i>Sclerotiniasclerotiorum</i>) Алтернария (<i>Alternaria brassicae</i>) Фомоза (<i>Phoma lingam</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-79 (разтворен втори лист - почти всички шушулки са оформени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П	35 дни		
103.	КАПТАН 80 ВГ Ариста ЛайфСайънс С.А.С, Франция Разрешение № 01376 – ПРЗ-3/01.12.2020 г. Заповед №РД 11-172/02.02.2016 г. Заповед № РД 11-618/19.04.2016 г. Заповед РД 11-1503/30.07.2019 г. Заповед №РД 11-2574 от 17.11.2020 г.	каптан 800 г/кг	150-190 г/дка	Домати (полско производство) Внася се при поява на първи симптоми Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>), Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Алтернария (<i>Alternaria solani</i>)	-	Домати – 21 дни; Ябълки Круши Дюли Азиатски круши – „Наши” - 28; Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череша – 21 дни; Ягоди -14 дни;	втора професионална	
			150-180 г/дка	Ябълки Круши Дюли Азиатски круши – „Наши”: Струпясване (<i>Venturia spp.</i>) : внася се преди цъфтеж: ВВСН 09-69 (зелените връхчета на листата са 5 мм над люспите на пъпките – край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали) Ранно и късно кафяво гниене (<i>Monillia spp.</i>) внася се след цъфтеж ВВСН 71-89 (размер на завръза до 10 mm;				

	следцъфтежно окапване-консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)
250 г/дка	Череш Внася се във фаза ВВСН 01-11 (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища) Къдравост (<i>Taphrina cerasi</i>)
250 г/дка	Сливи Внася се във фаза ВВСН 01-11 (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища-развиват се първите листа, вижда се оста на развиващия се лист) Кривули (мехурки) по сливи (<i>Tafrina pruni</i>)
250 г/дка	Праскови, Нектарини Внася се във фаза ВВСН 01-11 (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища- развиват се първите листа, вижда се оста на развиващия се лист) Къдравост (<i>Tafrina deformans</i>)
150-180 г/дка	Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череш Ранно и късно кафяво гниене (<i>Monilia spp.</i>), Сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>): внася се във фаза ВВСН 60-89 (първи отворени цветове – консумативна зрялост) Ранно и късно кафяво гниене (<i>Monilia spp.</i>): внася се във фаза ВВСН 81-87 (начало на оцветяване – беритбена зрялост)
150 г/дка	Ягоди (приложение в оранжерия) Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) при поява на първи симптоми

104.	КАПЪР КИЙ Индустриал Куимика Кий С. А., Испания Разрешение №01686-ПРЗ-1/14.03.2019 г. Заповед №РД 11-420/25.02.2019 г.	меден оксихлорид - 877,2 г/кг (Cu – 500 г/кг)	250г/дка	Минимална употреба Праскови, нектарини, кайсии, сливи Ранно кафяво гниене (<i>Monilia spp.</i>) Сачмянка (<i>Stigminacarpophila</i>) – внася се във фаза ВВСН 01-11 Брой мин/макс приложения – 1	П	21 дни	втора професионална	
			225 г/дка	Минимална употреба Череши Ранно кафяво гниене (<i>Monilia spp.</i>) Сачмянка (<i>Stigminacarpophila</i>) – внася се във фаза ВВСН 01-11 Брой мин/макс приложения – 1 Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КАПТАН 80 ВГ при минимални употреби	П	21 дни		
			180 - 300 г/дка	Лозя (винени сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 13 - 83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка		15 дни		
			150 - 300 г/дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 13 - 83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 60-120 л/дка Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка		15 дни		