

76.	КАРПОВИРУСИН Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция Разрешение № 01657- ПРЗ-2/16.11.2022 г. Заповед №РД 11- 55/14.01.2019 г. Заповед №РД11- 2413/02.11.2022 г.	Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M) в концентрация 1x10 ¹³ вирусни частици/литър	100 мл/продукт/ дка	Ябълки, круши, дюли, азиатски круши „Наши“ Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>); Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) – внася се във фаза ВВСН 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм, след цъфтежно окапване-консумативна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията – 10-12	П	1 ден	непрофесионална	
			100 мл/продукт/ дка	Праскови, нектарини, кайсии Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>); Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) – внася се във фаза ВВСН 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапва не на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията – 10-12 Вода мин/макс л/дка – 100 л/дка	П	1 ден		
			100 мл/продукт/ дка	Орези Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) – внася се във фаза ВВСН 71 – 89 Брой мин/макс приложения – 1-10 Интервал между приложенията – 10-12 Вода мин/макс л/дка – 100 л/дка	П	1 ден		
77.	КЕДУ Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01979- ПРЗ-2/02.10.2023 г. Заповед №РД 11-2191 от 21.09.2021 г. Заповед №РД11- 2155/20.09.2023 г.	етофенпрокс - 287.5 г/л	40 мл продукт/дка	Лозя Срещу Молци: - еднопоясен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i> / <i>Clysis</i>) - шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	14 дни	втора професионална	Spre8 - Опасно за пчелите./ Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители./ Да не се използва на места, където има активна паша на пчели./ Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност
			30 мл продукт/дка	Лозя Срещу Цикади: - американска лозова цикада (<i>Scaphoideus titanus</i>) - лозова цикада (<i>Empoasca vitis</i>) - <i>Metcalfa pruinosa</i> – внася се във фаза ВВСН 69-85 (край на цъфтеж- омекване на зърната) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	14 дни		
			20 мл продукт/дка	Маслодайна рапица Срещу Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-51 (разтворен първи лист-зелен бутон) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			20 мл продукт/дка	Синап Срещу Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-51 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			20 мл продукт/дка	Минимална употреба Култури за семенпроизводство на: зеленчукови, лечебни и ароматни растения Срещу Хоботници от род <i>Sitona</i> sp. Бълхи <i>Psylliodes</i> sp. Цветояди <i>Meligethes</i> sp. Хоботници от род <i>Lixus</i> sp. <i>Harpalus</i> sp. <i>Scutorhynchus</i> sp. Пцитовки <i>Cassida</i> sp., Хоботници от род <i>Baris</i> sp. – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ КЕДУ съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена	П	-		

				фитотоксичност при употребите на ПРЗ КЕДУ съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.				
78.	КЛАВИТУС 13 СЛ Виорил С.А., Гърция Разрешение № 02083- ПРЗ-1/03.07.2023 г. Заповед №РД11- 1345/07.06.2023 г.	мастни киселини C7-C20 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини C7-C18 и C18 (fatty acids C7 to C20 (fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts)) – 130,4 г/л	0.750-1.9 л/дка	Домати - Solanum lycopersicum (LYPES), Патладжан - Solanum melongena (SOLME), Сладък пипер - Capsicum annuum (CPSAN), Краставици - Cucumis sativus (CUMSA), сем. Картофиви - Cucurbitaceae, (1CUCF), Карфиол - Brassica oleracea var. botrytis (BRSOB), Зеле - Brassica oleracea (BRSOX) Срещу Белокрылка: Тютюнева белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), Оранжевийна белокрылка <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) – внася се При първа поява на следи от неприятелите. Следващо приложение - първа поява на неприятелите. ВВСН 21-87 (поява на първото основно странично разклонение (>5 cm)-плодовете от първото плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) при картофови ВВСН 19-87 (девет листа напълно разтворени--70% от плодовете са с типичен цвят на зреење) при тиквови ВВСН 20-74 (9 или повече разтворени същински листа – 40% от плодовете с типичен размер) при карфиол ВВСН 19-46 (9 или повече същински листа разтворени-60% от очаквания размер на главата е достигнат) при зеле Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	О	-	втора професионална	
			0.750-1.9 л/дка	Минимална употреба Домати - Solanum lycopersicum (LYPES), Патладжан - Solanum melongena (SOLME), Сладък пипер - Capsicum annuum (CPSAN), Краставици - Cucumis sativus (CUMSA), сем. Картофови - Cucurbitaceae, (1CUCF), Карфиол - Brassica oleracea var. botrytis (BRSOB), Зеле - Brassica oleracea (BRSOX), Фасул - Phaseolus vulgaris (PHSVX), Грах - Pisum sativum (PIBSX) – внася се при първа поява на следи от неприятелите. Следващо приложение - първа поява на неприятелите. ВВСН 21-87 (поява на първото основно странично разклонение (>5 cm)-плодовете от първото плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) при картофови ВВСН 19-87 (девет листа напълно разтворени-70% от плодовете са с типичен цвят на зреење) при тиквови ВВСН 20-74 (9 или повече разтворени същински листа – 40% от плодовете с типичен размер) при карфиол ВВСН 19-46 (9 или повече същински листа разтворени-60% от очаквания размер на главата е достигнат) при зеле ВВСН 19-79 (9 или повече листа разтворени-чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно) при фасул и грах	О			
			1,5-1,9 л/дка	Минимална употреба Украсни растения, Растения на закрито (NNZZ) Срещу Листни въшки <i>Aphids spp.</i> (APHISP), Трипси <i>Thrips spp.</i> (THRISP), Щитоносни въшки <i>Coccidae</i> (1COCF), <i>Diaspididae</i> (1DIASF), Акари (1ACARF) – внася се при първа поява на следи от неприятелите. Следващо приложение - първа поява на неприятелите Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КЛАВИТУС 13 СЛ за контрол срещу посочените неприятел при изброените култури в Приложение № 2 от настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КЛАВИТУС 13 СЛ за контрол срещу посочените неприятел при изброените култури в Приложение № 2 от настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.	О			