

			П – по 25 мл/продукт/д ка	Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
127.	КИДЕКА Нюфарм САС, Франция Разрешение № 01509 – ПРЗ-1/ 01.11.2017 г. Заповед № РД 11- 2129/19.10.2017 г.	мезотрион - 100 г/л	75 – 150 мл продукт /дка	Царевица Срещу едногодишни широколистни и житни плевели - внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) Брой мин/макс - 1 Вода л/дка мин/макс - 15 – 50 л/дка	П	-	втора професионална	
128.	КИЙНИЛ Индустриал Куимика Кий С.А., Испания Разрешение № 01881- ПРЗ-1/04.09.2020 г. Заповед №РД 11-1991от 27.08.2020 г.	флуроксипир 200 г/л	100 мл продукт/дка	Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен-ечемик, тритикале, ръж, овес) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12- 39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	със системно действие
			100 мл продукт/дка	Царевица Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист-растежа продължава до разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
			150 мл продукт/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза пролет- есен Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	15 дни		
			100 мл продукт/дка	Тревни площи Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 20-26 Брой мин/макс приложения – 1	П	-		

				Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
129	КИЛЕО Нюфарм ГмбХ & Ко КГ, Австрия Разрешение № 2002- ПРЗ-1/10.03.2022 г. Заповед №РД 11-226 от 17.02.2022 г.	глифозат – 240 г/л + 2,4 Д – 160 г/л	200-300 мл/дка	Полета след прибиране на реколтата, Унищожаване на стърнища, Преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семепроизводство Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след прибиране на реколтата или преди сеитба Активно растящи плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 1) Третираните или засадени върху обработена с глифозат почва зърнени култури да не се използват за храна за животни. 2) Третираната люцерна или засадена върху третирана почва да не се използва за производството на храна, хранителни добавки и фураж.	П	-	втора професионална	тотален хербицид със системно действие Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи,
			400-500 мл/дка	Полета след прибиране на реколтата, Унищожаване на стърнища, Преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семепроизводство Срещу многогодишни житни и широколистни плевели – внася се след прибиране на реколтата или преди сеитба. Плевели в цъфтеж или малко по-късно Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
			400-500 мл/дка	Неземеделски площи, Индустриални зони и строителни работи, железопътни линии Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се на пролет до лято Активно растящи плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П			
			400-500 мл/дка	Неземеделски площи, Индустриални зони и строителни работи, железопътни линии Срещу многогодишни житни и	П			