

126.	КИВИ ЕКСТРА 6 ОД ИСК Биосайънсис Юръп Н.В., Белгия Разрешение № 01617-ПРЗ-1/13.09.2018 г. Заповед № РД 11- 1742/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-1560 от 07.07.2021 г.	никосулфурон - 60 г/л	50-75 мл/продукт/д ка	Царевина (за фураж и зърно) Срещу Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	
			I- во третиране 50 мл/продукт/д ка II – ро 25 мл/продукт/д ка	Царевина (за фураж и зърно) Срещу Балур (<i>Sorghum Halepense</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-18 разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист Брой мин/макс приложения – 1+1 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
127.	КИДЕКА Нюфарм САС, Франция Разрешение № 01509 – ПРЗ-1/ 01.11.2017 г. Заповед № РД 11- 2129/19.10.2017 г.	мезотрион - 100 г/л	75 – 150 мл продукт /дка	Царевина Срещу едногодишни широколистни и житни плевели - внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) Брой мин/макс - 1 Вода л/дка мин/макс - 15 – 50 л/дка	П	-	втора професионална	
128.	КИЙНИЛ Индустриал Куимика Кий С.А., Испания Разрешение № 01881- ПРЗ-1/04.09.2020 г. Заповед №РД 11-1991от 27.08.2020 г.	флуороксибир 200 г/л	100 мл продукт/дка	Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен-ечемик, тритикале, ръж, овес) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12- 39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	със системно действие
			100 мл продукт/дка	Царевина Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист-растежа продължава до разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения – 1	П	-		

				Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150 мл продукт/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза пролет-есен Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	15 дни		
			100 мл продукт/дка	Тревни площи Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 20-26 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
129.	КИЛЕО Нюфарм ГмбХ & Ко КГ, Австрия Разрешение № 2002- ПРЗ-1/10.03.2022 г. Заповед №РД 11-226 от 17.02.2022 г.	глифозат – 240 г/л + 2,4 Д – 160 г/л	200-300 мл/дка	Полета след прибиране на реколтата, Унищожаване на стърнища, Преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семенпроизводство Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след прибиране на реколтата или преди сеитба Активно растящи плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 1) Третираните или засадени върху обработена с глифозат почва зърнени култури да не се използват за храна за животни. 2) Третираната люцерна или засадена върху третирана почва да не се използва за производството на храна, хранителни добавки и фураж.	П	-	втора професионална	тотален хербицид със системно действие Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих,
			400-500 мл/дка	Полета след прибиране на реколтата, Унищожаване на стърнища, Преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семенпроизводство Срещу многогодишни житни и широколистни плевели – внася се след прибиране на реколтата	П	-		