

				(растеж на първите листа - узряването на плодовете) (април-ноември) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 90 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване				
			450 мл /дка	Маслини (трапезни и за зехтин) За контрол на издънки – внася се пролет, лято и есен ВВСН 70 - 77 (връзване на плодовете – узряване) (май-юли) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 1,5-60 л/дка Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване.	П	30 дни		
			340-450 мл/дка	Цитрусови култури Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се Първо приложение през пролетта-лятото (април-юли) и второ приложение през есента. ВВСН 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване	П	30 дни		
130	КЛЕРАВО БАСФ СЕ, Германия Разрешение №01485 – ПРЗ-1/27.06.2017 г. Заповед № РД 11- 1199/07.06.2017 г.	имазамокс 35 г/л квинмерак 250 г/л	0,1л/дка	Зимна маслодайна рапица Клиърфийлд толерантни хибриди Срещу едногодишни широколистни и житни плевели Прилага се във фаза ВВСН 10-18(напълно оформени котиледони-разтворен 8 лист) Да не се прилага повече от един път на три години Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	

131.	КЛЕРАНДА + ДЕШ БАСФ ЕООД Разрешение № 01130- ПРЗ- 6/05.02.2018 г. Заповед №РД 11- 877/27.07.2011 г. ; Заповед №РД 11- 522/03.05.2012 г.; Заповед №РД 11- 847/05.08.2013 г. и Заповед №РД 11- 142/18.01.2018 г. Заповед №РД 11- 1856/07.08.2023 г.	375 г/л метазахлор 17, 5 г/л имазамокс	150 мл/дка – 200 мл/ в зависи мост от степенна на заплевеляван е	Зимна маслодайна рапица (<i>Клиърфийлд хибриди</i>) Срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели, преди фаза братене на житните и самосевките от житни култури. Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ. Вода л/дка - 15-40 л/дка Единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ	-	-	втора професионална	със системно действие
132.	КЛИК ДУО Сипкам Оксон С.П.А., Италия Разрешение № 01518 – ПРЗ-4/12.09.2023 г. Заповед №РД 11- 2124/19.10.2017 г. Заповед №РД 11-2656 от 25.11.2020 г. Заповед №РД 11-2672 от 10.11.2021 г. Заповед №РД 11- 1895/08.08.2023 г.	тербутилазин - 125 г/л пендиметалин – 250 г/л	400 мл/продукт / дка	Царевина Срещу едногодишни широколистни и житни плевели – внася се след сеитба преди поникване на културата и плевелитеф ВВСН 01-03 начало на набъбването - край на набъбването Брой мин/макс приложения - едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка	-	-	втора професионална	
133.	КЛИК КОМБИ Оксон Италия СпА Разрешение № 01591/02.07.2018 г. Заповед №РД 11- 1043/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-1172 от 24.06.2019 г. Заповед №РД 11-2675 от 10.11.2021 г.	тербутилазин - 300 г/л диметенамид-П – 265 г/л	250-280 мл/продукт/д ка	Царевина Срещу едногодишни и многогодишни широколистни и някои житни плевели - ВВСН 01-09- начало на набъбването- поникване/колеоптила пробива земната повърхност (преди поникване) Брой мин/макс приложения – едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка	П	Карантинни ят срок се покрива от времето между приложение то (преди поникване) и прибирането на реколтата	втора професионална	
			250 мл/продукт/д ка	Царевина Срещу едногодишни и многогодишни широколистни и някои житни плевели		Карантинни ят срок се покрива от		