

			340-450 мл/дка	Цитрусови култури Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се Първо приложение през пролетта-лялото (април-юли) и второ приложение през есента. ВВСН 11 - 79 (развитие на първите листа - плодове са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да се използват земеделски практики за елиминирание на кръстосано замърсяване	П	30 дни		
130.	КЛЕРАВО БАСФ СЕ, Германия Разрешение №01485 – ПРЗ-1/27.06.2017 г. Заповед № РД 11- 1199/07.06.2017 г.	имазамокс 35 г/л квинмерак 250 г/л	0,1 л/дка	Зимна маслодайна рапица Клиърфийлд толерантни хибриди Срещу едногодишни широколистни и житни плевели Прилага се във фаза ВВСН 10-18 (напълно оформени котиледони-разтворен 8 лист) Да не се прилага повече от един път на три години Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	
131.	КЛЕРАНДА + ДЕШ БАСФ ЕООД Разрешение № 01130- ПРЗ- 6/05.02.2018 г. Заповед №РД 11-877/27.07.2011 г. ; Заповед №РД 11-522/03.05.2012 г.; Заповед №РД 11-847/05.08.2013 г. и Заповед №РД 11-142/18.01.2018 г. Заповед №РД 11-1856/07.08.2023 г.	375 г/л метазахлор 17, 5 г/л имазамокс	150 мл/дка – 200 мл/ в зависи мост от степената на заплевеляван е	Зимна маслодайна рапица (Клиърфийлд хибриди) Срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели, преди фаза братене на житните и самосевките от житни култури. Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ. Вода л/дка - 15-40 л/дка Единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ	-	-	втора професионална	със системно действие