

			30 кг продукт /дка	Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода Срещу Плевелни семена				
			50 кг продукт /дка	Почва за саксии, почвени субстрати, компост Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				
			50 кг продукт /дка	Създаване/обновяване на обществени тревни площи (вкл. игрища) Срещу Плевелни семена – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П	-		
20.	БЕЛЕМ 0,8 МГ / КОЛОМБО 0,8 МГ СБМ Девелопмънт, Франция Разрешение № 01198-ПРЗ-5/16.09.2019 г. Заповед №РД 11-1847/09.12.2015 г. Заповед № РД 11-1740/21.08.2019 г. Заповед №РД 11-1967 от 26.08.2021 г.	8 г/кг циперметрин	1,2 кг продукт/ дка	Царевича Срещу Западен коренов царевичен червей (<i>Diabrotica virgifera</i>) Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-	непрофесионална	Прилага се по време на сеитба (ВВСН 00) - механизирано със сеялка и приставка –специален микрогранулен апликатор
			1,2 кг продукт/ дка	Сорго Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Слънчоглед Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Моркови, хрян, целина, пашърнак, корен от магданоз, репички, жълта ряпа Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) морковена муха (<i>Psila rosae</i>) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Червено цвекло Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Главесто зеле брюкселско зеле, броколи, карфиол Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) зелева коренова въшка (<i>Delia radicum</i>) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				

			1,2 кг продукт/ дка	Домати, патладжан Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.) сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			2,4 кг продукт/ дка	Картофи Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.) – внася се при засаждане на дълбочина 8 см Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Чесън, лук, дребен лук Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.); лукова муха (<i>Delia antiqua</i>) - внася се при разсаждане на дълбочина 8 см Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Пъпеш, дини Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.); сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) - внася се При разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Краставици Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.); сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) - внася се При разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Тиквички Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.); сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Тикви Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.); сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) - внася се при разсаждане на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Маслодайна рапица Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.) зелева муха (<i>Delia brassicae</i>); рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) - внася се при сеитба (BVCH 00) на дълбочина 2 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Тютюн Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.); сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) - внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Памук Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.); сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) - внася се при сеитба на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				

			1,2 кг продукт/ дка	Торф, трева Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.); сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) - внася се при сеитба (BBCH 00) на дълбочина 2 см. Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Минимална употреба Домати, пипер, картофи Срещу Попово прасе (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) – внася се при разсаждане/сеитба Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули				
			1,2 кг продукт/ дка	Минимална употреба Торф, трева Срещу Майски бръмбар (<i>Melolontha melolontha</i>) – внася се при сеитба (BBCH 00) на дълбочина 2 см Брой мин/макс приложения – 1 Продуктът се прилага като сухи гранули Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на БЕЛЕМ 0,8 МГ/КО.ЛОМБО 0,8 МГ при минималните употреби				
21.	БЕЛПРОЙЛ-А Пробелте С.А.Ю, Испания Разрешение № 01662-ПРЗ-1/06.02.2019 г. Заповед №РД 11-194 от 24.01.2019 г.	<u>парафиново</u> <u>масло</u> 830 г/л (CAS № 8042-47-5)	0,375-1,5 л/дка	Костилкови овощни видове (кайсии череши вишни праскови нектарини, сливи) Срещу Червен овошен акар (<i>Panonychus ulmi</i>), Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка Да се извърши поливка една седмица преди третиране	П	-	втора професионална	
			0,375-1,5 л/дка	Костилкови овощни видове (кайсии череши вишни праскови нектарини, сливи) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), Черничева щитоносна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) – внася се преди промяна в цвета на плодовете Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка Да се извърши поливка една седмица преди третиране	П	-		
			0,375 -1,5 л/дка	Семковни овощни видове (ябълки, круши) Срещу Червен овошен акар (<i>Panonychus ulmi</i>), Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка Да се извърши поливка една седмица преди третиране	П	-		
			0,375 -1,5 л/дка	Семковни овощни видове (ябълки, круши) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), Черничева щитоносна въшка (<i>Pseudacalaspis pentagona</i>) – внася се преди промяна в цвета на плодовете Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка Да се извърши поливка една седмица преди третиране	П	-		
			1- 2,25 л/дка	Цитрусови култури (портокал мандарина лимон грейпфрут) Срещу Щитоносни въшки: (<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Parlatoria pergandei</i> , <i>Lepidosaphes beckii</i> , <i>Aspidiotus nerii</i>) – внася се преди промяна в цвета на плодовете Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 60 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка Април – ноември	П	-		
22.	БЕЛТИРУЛ	<i>Bacillus</i>	50-100 г /дка	Култури от сем тиквови, с ядлива кора	П	2	непрофесионална	с несистемно действие

			20 мл продукт/ дка	Декоративни храсти и дървета, цветя Срещу Листни въшки <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Phyllaphis fagi</i> – внася се във фаза ВВСН 12-59 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 7 Вода мин/макс л/дка – 20–200 л/дка Приложение при поява на първите насекоми	О	-		
			20 мл продукт/ дка	Декоративни храсти и дървета, цветя Срещу Белокрылки <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> – внася се във фаза ВВСН 12-59 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 7 Вода мин/макс л/дка – 20–200 л/дка Приложение при поява на първите подвижни форми	О	1 ден		
			40 мл/дка	Декоративни храсти и дървета, цветя Срещу Белокрылки <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> – внася се във фаза ВВСН 12-59 Брой мин/макс приложения – 1 Вода мин/макс л/дка – 20–200 л/дка Приложение при силно нападение				
79.	КОЛОМБО 0,8 МГ СБМ Девелопмънт, Франция Франция	Второ търговско име на БЕЛЕМ 0,8 МГ						
80.	КОРАГЕН 20 СК/ ВОЛНАМ/ ШЕНЗИ 200 СК ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 01126-ПРЗ- 8/09.01.2024 г. Заповед №РД 11- 682/22.04.2016 г. Заповед №РД 11- 377/01.03.2018 г. Заповед №РД 11-2573 от 17.11.2020 г. Заповед №РД 11-2258 от 01.10.2021 г. Заповед № РД11- 543/09.03.2023 г. Заповед № РД11- 3031/22.12.2023 г.	хлорантранилипрол – 200 г/л	16 – 30 мл/дка	Ябълки, круши Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>); Листоминиращи молци (<i>Leafminers</i>); Листозави-вачки (<i>Tortricidae</i>); Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) внася се във фаза ВВСН 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следлъфтежно окапване -беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 12 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка	П	14 дни	непрофесионална	С несистемно действие
			16 – 30 мл/дка	Праскови, нектарини, кайсии Срещу Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>); Прасковен клонков молец (<i>Anarsia lineatella</i>)-внася се във фаза ВВСН 15-49 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка		14 дни		
			16 – 30 мл/дка	Сливи Срещу Сликов плодов червей (<i>Cydia funebrana</i>); Малка зимна педомерка (<i>Opherophthera brumata</i>)-внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка		14 дни		
			18 – 30 мл/ дка (18-20 mL/hL)	Орехи Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) – внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка		21 дни		
			18 – 30 мл/ дка (18-20 mL/hL)	Кестени Срещу Плодови червеи (<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia fagiglandana</i>); Кестенов хоботник (<i>Curculio elephas</i>)- внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2		21 дни		