

	Заповед №РД 11-1557/29.08.2016 г. Заповед №РД 11-255/1.02.2019 г. Заповед №РД 11-790 от 22.04.2021 г. Заповед №РД 11-2170/20.09.2023		400-600 г/дка	При дълбочина на инкорпориране до 10 см При дълбочина на инкорпориране до 20 см При дълбочина на инкорпориране до 30 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			100-200 г/дка	Растителни остатъци след прибиране на реколтата от културите: марули, фасул, моркови, грах, краставици, патладжан, зеле, карфиол, лук, чесън, аспержи, целина, тиквички, пипер, картофи, домати, дини, слънчоглед, рапица, гербер, хризантема Склеротиния Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
126.	КОПФОРС ЕКСТРА ЗЕНИТ КРОП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Разрешение № 01960-ПРЗ-2/13.10.2021 г. Заповед №РД 11-1288 от 18.06.2021 г. Заповед №РД 11-2326 от 12.10.2021 г.	<u>цимоксанил</u> – 60 г/кг + <u>меден хидроксид</u> - 461 г/кг (чиста мед - 300 г/кг) (кандидат за замяна)	200 г/дка	Картофи Срещу Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза ВВСН 21-90 (поява на 1-во основно странично разклонение - стареене) Брой мин/макс приложения – 1-5 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка Да не се прилага повече от един път при производ-ство на ранни картофи	П	14 дни	втора професионална	SPe8 - Опасен за пчелите с комбинирано действие (системно и несистемно)
			200 г/дка	Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 55-80 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-начало на узряване) Брой мин/макс приложения -1-4 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка	П	28 дни		
			200 г/дка	Домати Срещу Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>), Кафяви листни петна (алтернария) (<i>Alternaria solani</i>) – внася	П	3 дни		

				се във фаза ВВСН 51-71 (първо съцветие изправена пъпка – първа китка: първи плод с типичен размер) Брой мин/макс приложения -1-4 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка				
127.	КОРСЕЙТ 60 ВГ Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01400 – ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед №РД 11-685/22.04.2016 г. Заповед №РД 11-2377/22.11.2018 г. Заповед №РД 11-520 от 11.03.2021 г.	симоксанил 600 г/кг	20-30 г/дка с раб. р-р 50-130 л/дка	Домати Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни (от разсаждането до пълна зрялост, ВВСН 15-89 от пети същински лист до пълна зрялост).		Домати Краставици, Тиквички Дини, Пъпеши, Тикви-3; Марули, Лук, Чесън, Праз , Картофи - 7	втора професионална	
			20-30 г/дка с раб. р-р 50-130 л/дка	Краставици, Тиквички Кубинска мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни (от разсаждането до пълна зрялост, ВВСН 15-89 от пети същински лист до пълна зрялост).				
			40 г/дка с раб. р-р 50-100 л/дка	Дини, Пъпеши, Тикви Кубинска мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни (от разсаждането до пълна зрялост, ВВСН 15-89 от пети същински лист до пълна зрялост).				
			20-40 г/дка с раб. р-р 50-100 л/дка	Марули Мана (<i>Bremia lactucae</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни във фенофази ВВСН 19-49 от девет или повече същински разтворени листа до формирана цялата листна маса.				
			30-40 г/дка с раб. р-р 30-100 л/дка	Лук, Чесън, Праз Мана (<i>Peronospora destructor</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни във фенофази ВВСН 15-48 от пети лист >3 см ясно видим до при 50%				