

			20 мл продукт/ дка	Декоративни храсти и дървета, цветя Срещу Листни въшки <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Phyllaphis fagi</i> – внася се във фаза ВВСН 12-59 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 7 Вода мин/макс л/дка – 20–200 л/дка Приложение при поява на първите насекоми	О	-		
			20 мл продукт/ дка	Декоративни храсти и дървета, цветя Срещу Белокрылки <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> – внася се във фаза ВВСН 12-59 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 7 Вода мин/макс л/дка – 20–200 л/дка Приложение при поява на първите подвижни форми	О	1 ден		
			40 мл/дка	Декоративни храсти и дървета, цветя Срещу Белокрылки <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> – внася се във фаза ВВСН 12-59 Брой мин/макс приложения – 1 Вода мин/макс л/дка – 20–200 л/дка Приложение при силно нападение				
79.	КОЛОМБО 0,8 МГ СБМ Девелопмънт, Франция Франция	Второ търговско име на БЕЛЕМ 0,8 МГ						
80.	КОРАГЕН 20 СК/ ВОЛНАМ/ ШЕНЗИ 200 СК ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 01126-ПРЗ- 8/09.01.2024 г. Заповед №РД 11- 682/22.04.2016 г. Заповед №РД 11- 377/01.03.2018 г. Заповед №РД 11-2573 от 17.11.2020 г. Заповед №РД 11-2258 от 01.10.2021 г. Заповед № РД11- 543/09.03.2023 г. Заповед № РД11- 3031/22.12.2023 г.	хлорантранилипрол – 200 г/л	16 – 30 мл/дка	Ябълки, круши Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>); Листоминиращи молци (<i>Leafminers</i>); Листозави-вачки (<i>Tortricidae</i>); Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) внася се във фаза ВВСН 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следлъфтежно окапване -беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 12 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка	П	14 дни	непрофесионална	С несистемно действие
			16 – 30 мл/дка	Праскови, нектарини, кайсии Срещу Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>); Прасковен клонков молец (<i>Anarsia lineatella</i>)-внася се във фаза ВВСН 15-49 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка		14 дни		
			16 – 30 мл/дка	Сливи Срещу Сликов плодов червей (<i>Cydia funebrana</i>); Малка зимна педомерка (<i>Opherophthera brumata</i>)-внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка		14 дни		
			18 – 30 мл/ дка (18-20 mL/hL)	Орехи Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) – внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка		21 дни		
			18 – 30 мл/ дка (18-20 mL/hL)	Кестени Срещу Плодови червеи (<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia fagiglandana</i>); Кестенов хоботник (<i>Curculio elephas</i>)- внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2		21 дни		

				Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка			
			18 – 30 мл/дка (18-20 mL/hL)	Бадеми Срещу Прасковен молец (<i>Anarsia lineatella</i>)- внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка		21 дни	
			15 –27 мл/ дка	Лозя (винени и десертни сортове) Срещу Гроздови молци (<i>L. botrana</i> , <i>E. ambiguella</i>) Малка лозова листозавивачка (<i>Argyrotoenia pulchellana</i>)- внася се във фаза ВВСН 57-83 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени- зърната формират цвят Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс - 50-150 л/дка		30 дни	
			15 –21,6 мл/ дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Гроздови молци (<i>L. botrana</i> , <i>E. ambiguella</i>) Малка лозова листозавивачка (<i>Argyrotoenia pulchellana</i>) – внася се във фаза ВВСН 57-85 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване и зърната Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 50-120 л/дка		3 дни	
			10 – 15 мл/ дка	Царевича и сладка царевича Срещу Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>); <i>Sesamia spp.</i> Ношенки (<i>H. armigera</i> , <i>S. exigua</i>) – внася се във фаза 1)ВВСН14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря 2)ВВСН73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка		7 дни	
			12,5-17,5 мл/ дка	Картофи Срещу Картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-93 Начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-повечето от листата са пожълтели Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 8 Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка	П	14 дни	
			5-6 мл/ дка	Картофи Срещу Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-69 Начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-край на цъфтежа на първото съцветие Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка		14 дни	
			18 – 30 мл/дка (18-20 mL/hL)	Лешник Срещу Лешников хоботник (<i>Curculio nucum</i>) – внася се във фаза ВВСН 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка		21 дни	

			14-20 мл/дка (14-20 mL/hL)	Домати, патладжан Срещу Египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>) Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>) Гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) - BVCH 71-89 Първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка		1 ден		
			16 – 30 мл/дка (16-20 mL/HL)	Минимални употреби Ябълки, круши Срещу Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фаза BVCH 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следлъфтежно окапване до: Беритбена зрялост Интервал между приложенията – 12 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка		14 дни		
			70-150 л/дка	Минимални употреби Праскови, кайсии, нектарини Срещу Петнистокри ла дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) внася се във фаза BVCH 15-49 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка		14 дни		
			16 – 30 мл/ дка (16-20 mL/hL)	Минимални употреби Сливи Срещу Петнистокри ла дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фаза BVCH 73-87 От: Вторично окапване на завръза До: Беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 70-150 л/дка		14 дни		
			15 –27 мл/ дка	Минимални употреби Лозя (винени сортове) Срещу Петнистокри ла дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се във фаза BVCH 57-83 От: Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени До: Зърната формират цвят Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс - 50-150 л/дка		30 дни		
			15 –21,6 мл/ дка	Минимални употреби Лозя (десертни сортове) Срещу Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>)- внася се във фаза BVCH 57- 85 От: Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени До: Омекване н зърната Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 50-120 л/дка		3		
			14 –20 мл/ дка	Минимални употреби Домати Срещу Доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>)-внася се във фаза BVCH 71–89 От: Първа китка: първи плод с типичен размер До: Пълна зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка		1 ден		

			14-20 мл продукт /дка	Минимални употреби Домати Доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) – внася се във фаза ВВСН 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 28 дни Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КОРАГЕН 20 СК за контрол на домати миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) при домати. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КОРАГЕН 20 СК за контрол на домати миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) при домати е на лицето, прилагащо продукта	О	1 ден		
			10–15 мл/ дка	Минимална употреба Царевица и сладка царевица Срещу Ливадна пеперуда (<i>Loxostege sticticalis</i>) – внася се във фаза 1) ВВСН14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря 2) ВВСН73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка	П	7 дни		
			14-20 мл/дка	Минимална употреба Домати, патладжан Срещу Ливадна пеперуда (<i>Loxostege sticticalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 71-89 Първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КОРАГЕН 20 СК/ВОЛИАМ за контрол на Ливадна пеперуда (<i>Loxostege sticticalis</i>) при царевица, сладка царевица, домати и патладжан. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КОРАГЕН 20 СК/ВОЛИАМ за контрол на Ливадна пеперуда (<i>Loxostege sticticalis</i>) при царевица, сладка царевица, домати и патладжан е на лицето, прилагащо продукта.	П	1 ден		
81.	КРИСАНТ ЕК Сипкам Иберия С.Л., Испания Разрешение № 01503-ПРЗ-1/25.09.2017 г. Заповед №РД 11-202/07.06.2017 г. Заповед №РД 11-1844/05.09.2017г. Заповед №РД 11-980 от 13.05.2020 г.	пиретрини – 40 г/л	75 мл/дка	Домати, пипер, патладжани Белокрилки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се при поява на неприятеля Максимален брой приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 83 -100 л/дка		1 ден	втора професионална	SPe8-Опасен за пчелите
			75 мл/дка	Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква) Белокрилки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 83-100 л/дка	П/О	1 ден		