

				от растения, листата са омекнали и прегънати.			
			15-20 г/дка с раб. р-р 30-100 л/дка	Картофи Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Максимален брой приложения за ВП – 5 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни във фенофази ВВСН 15-93 от пет разтворени листа до повечето листа са пожълтели.			
128.	КОСАЙД 2000 ВГ Шпийс Урания Кемикъл ГмбХ, Германия Разрешение № 569-ПРЗ - 4/15.05.2018 г. Заповед 12-42/10.09.2004 г Заповед №РД 11-1102/24.06.2015 г. Заповед №РД 11-1511/02.10.2015 г. Заповед №РД 11-703/19.04.2018 г. Заповед №РД 11-718 от 18.03.2020 г.	меден хидроокис- 538 г/кг=350 г/кг чиста мед	0,12 % (120 г за 100 л/дка раб.р-р)	Лоза Мана по лоза	П	Лоза -14 дни; Бадем -28; Лешник, Орех*:-28; Круша, Ябълка, Кайсия, Праскова, нектарина, малини – не приложимо; Краставици, пъпеш – 7; Фасул - 7; Фъстъци -21; Целина – 7;Ягоди-3, Ягоди(поокй)–Не приложимо;	непрофесионална
			185-340г/дка	Бадем Сачмянка(<i>Stigmina carpophila</i>)-ВВСН 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) брой третирания до 3 Бактериоза по бадем (<i>Pseudomonas atygdalii</i>)-ВВСН 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) – внася се във фаза ВВСН 51-59 (Цветните пъпки са затворени до повечето цветове са оформени като топчици) брой третирания – 1			
			155-680 г /дка	Круша Струпясване (<i>Venturia pirina</i>), Сиви листни петна (<i>Septoria</i> spp.), Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>), Бактериоза (<i>Pseudomonas syringae</i>), Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>) внася се във фаза ВВСН 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките)			
			155- 680 г/дка	Ябълка Листни петна (<i>Septoria</i> spp.), Бактериоза (<i>Pseudomonas syringae</i>), Огнен пригор <i>Erwinia amylovora</i>) внася се във фаза ВВСН 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките)			

155 – 280 г/дка	Кайсия Сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>)- ВВСН 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките) Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>) - ВВСН 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките)
155 – 285 г/дка	Праскова, нектарина Сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>)- ВВСН 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) Струпясване (<i>Cladosporium carpophilum</i>) - ВВСН 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките) Бактериоза (<i>Pseudomonas spp.</i>) - ВВСН 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана)
100 – 155 г/дка	Красавици, пъпеш Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Антракноза (<i>Colletotrichum lagenarium</i>), Краста (<i>Cladosporium cuscumerinum</i>), Бактерийно увяхване (<i>Erwinia tracheiphila</i>) – внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване
100-155 г/дка	Фасул Листни петна (<i>Cercospora spp.</i>), Бактериоза (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas phaseolicola</i>) – внася при поява на първи симптоми на заболяване
155 г/дка	Фъстъци Ранни листни петна (<i>Cercospora spp.</i>) - внася при поява на първи симптоми на заболяване
100-155 г/дка	Целина Листен пригор (<i>Septoria apiicola</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-19 (Разтворен 3-ти същински лист до 9 или повече същински разтворени листа)
125 г/дка	Ягоди Бели листни петна (<i>Mycosphaerella</i>

			<i>fragarie</i>), Листно припламване, виолетовокафяви листни петна (<i>Diplocarpon earliana</i>), Ветриловидни петна (<i>Phomopsis obscurans</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване)
	125 г/дка		Ягоди Бели листни петна (<i>Mycosphaerella fragarie</i>), Листно припламване, виолетовокафяви листни петна (<i>Diplocarpon earliana</i>), Ветриловидни петна (<i>Phomopsis obscurans</i>) ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка)
	125 г/дка		Минимална употреба Малини Петносване на пъпките (<i>Didimella applanata</i>), Антракноза (<i>Sphaceloma necator</i>)= (<i>Gleosporium venetum</i> ,) Септориоза Внася се във фаза ВВСН 91-00 (Навлизане в покой)
	155 – 340 г /дка		Минимална употреба Лешник, Орех Бактериоза (<i>Xanthomonas corylina</i>) внася се във фаза ВВСН 91-99 (Разтежа на леторастите е завършил до продукцията е прибрана)
	150- 325 г/дка		Лимон Сухо гниене (<i>Phoma tracheiphila</i>), Антракноза (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), Листни петна (<i>Septoria</i> spp.) внася се във фаза ВВСН 95-97 (Окапване на старите листа до зимен покой) Възможно е приложение извън стадий 97-99, след градушка или измръзване
	125 г/дка		Минимална употреба Рози Срещу Болести, включително

--	--	--	--

			ръжда (<i>Phragmidium mucronatum</i> L.) и черни листни петна (<i>Diplocarpon rose Wolf</i>) – внася се От навлизане в зимен покой до начало на набъбване на пъпките Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50 – 80 л/дка Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активно вещество мед (Cu-мед) в дози, надхвърлящи 4 кг мед/хектар годишно Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КОСАЙД 2000 ВГ при минимални употреби Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КОСАЙД 2000 ВГ минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.					
129.	КРАЙОР ИСК Биосайансис Юръп Н.В., Белгия Разрешение №01727-ПРЗ-1/15.07.2019 г. Заповед №РД 11-1148 от 20.06.2019 г.	изофетамид 400 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ КЕНЖА с Разрешение № 01692-ПРЗ/издание 1/14.03.2019 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			непрофесионална		
130.	КУАДРИС 25 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01003-5/26.06.2020 г. Заповеди №: РД 09-664/09.12.2004 г. РД 12-42/10.09.2004 г. Заповед № РД 12-7/18.01.2011 г. Заповед №РД 11-1711/29.10.2014г. Заповед №РД 11-1329 от 23.06.2020 г.	250 г/л азоксистробин	0,075-0,1% (75-100 мл продукт/дка със 100 л/дка работен разтвор)	Лозя (винени и десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>) Черно гниене (<i>Guignardia bidwellii</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-81 (Третите листа са отворени – Начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-12 дни Вода л/дка мин/макс - 50-120 л/дка Максимум 2 после-дователни приложо	П	21 дни	непрофесионална	със системно действие