			75 мл/продукт/дка	**Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички)** Белокрилки (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* - внася се при поява на неприятеля Максимален брой приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 83 -100 л/дка		1 ден		
			60 мл/дка	**Марули, полска салата/ кълнове салата, рукола, кресон и кълнове, земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия/ (включително бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло** Листни въшки (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae*) - при поява на неприятеля Максимален брой приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 66-80 л/дка		2 дни		
			75 мл/дка	**Праскова, нектарина** Прасковена листна въшка (*Myzus persicae*) – внася се при поява на неприятеля Максимален брой приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 83-100 л/дка		3 дни		
			75 мл/дка	**Кайсия, слива, череша** Прасковена листна въшка (*Myzus persicae*) Внася се при поява на неприятеля. Преди цъфтеж Максимален брой приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 83-100 л/дка		-		
			75 мл/дка	**Лозя** Лозова цикада *(Scaphoideus titanus)- внася се* след цъфтеж BBCH 75 (гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата да увисват) Максимален брой приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 83-100 л/дка		3 дни		
83.	**КУИКФОС дражета/пелети** ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю.А., Нидерландия Удостоверение № 152/09.02.2004 г.	57 % алуминиев фосфид	30 дражета (пелети)/тон зърно	За обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова и житна гърлица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръж- дивочервен зърнов бръмбар, Palorus spp. Експозиция: 3 денон.при t на зърното над 20°C, 5 денон.при t на зърното 15-20°C, 7 денон. При t на зърното 10-15°C Забележка: Третирането да се извърши с автомотичен дозатор над редлера на силозната клетка. За празното простран-ство над зърното в силозната клетка да се дозира на повръхността по 1 табл./м^2		зърно - 45 дни	1	
84.	**КУИКФОС овални таблетки** ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю.А., Нидерландия Удостоверение № 66/21.06.2003 г.	57 % алуминиев фосфид	10 табл./тон зърно	За обеззаразяване на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гърлица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждиво-червен зърнов бръмбар; Palorus spp. Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°C; 5 денонощия при t 15-20°C; 7 денонощия при t 10-15°C Третирането да се извършва чрез пригодени сонди за дозиране в купа, автоматичен дозатор над лентата или ръчно пускане. Купът след третирането да се покрие с полиетилен или гумиран брезент		зърно – 45 дни	1	
85.	**КУИКФОС ТОРБИ** ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю.А., Нидерландия Разрешение № 02009-ПРЗ-2/17.05.2023 г.	алуминиев фосфид - 560 г/кг	15 г продукт/м^3 (1 х 34 г торба/2м^3 пространство)	**Фумигация (обеззаразяване) на зърно (пшеница, ечемик, овес, ориз, ръж, тритикале); в пакетирано и насипно състояние** Вредители по съхранявано зърно* (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми) – внася се при съхранение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 56 дни	3	До пониже-ние на стойността на фосфин под 0,01 mg/m^3 (ppm) в непо-средствена близост до зърното, след вентила-ция	първа професионална	14 дни експози-ция при t 10-15°C 7 дни експози-ция при t 16-25°C 5 дни експози-ция при t

	Заповед №РД 11-564 от 28.03.2022 г. Заповед №РД 11-1013/04.05.2023 г.		(3 х 10 г торба/2м^3 пространство)					26-35°C
			15 г продукт/м^3 (1 х 34 г торба/2м^3 пространство) (3 х 10 г торба/2м^3 пространство)	**Празни складове/структури за съхранение (предназначени за съхранение на растителни продукти)** Срещу Вредители по съхранявано зърно* (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 56 дни **Означения:** * Вредители по съхранявано зърно във всички стадии на насекомите (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми): житна гъгрица (*Sitophilus granarius*), оризова гъгрица (*Sitophilus oryzae*), царевична гъгрица (*Sitophilus zea-mays*), зърнов бръмбар (*Rhyzopertha dominica*), ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), малък брашнен бръмбар (*Tribolium confusum*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*), ръждивочервен зърнов бръмбар (*Cryptolestes ferrugineus*), тютюнев бръмбар (*Lasioderma serricorne*), хлебен бръмбар (*Stegobium paniceum*), индийски молец (*Plodia interpunctella*), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*), средиземноморски брашнен молец или мелничен молец (*Ephestia kuehniella*).		До пониже-ние на стойността на фосфин под 0,01 mg/m^3 (ppm) в непо-средствена близост до зърното, след вентила-ция		14 дни експози-ция при t 10-15°C 7 дни експози-ция при t 16-25°C 5 дни експози-ция при t
86.	**ЛАИНКОЙЛ** Лаинко С.А., Испания Разрешение № 01569-ПРЗ-1/19.03.2018 г. Заповед №РД 11-461/15.03.2018 г. Заповед №РД 11-3044 от 14.12.2021 г.	парафиново масло (CAS № 8042-47-5) - 790 г/л	1.5 л продукт /дка	**Костилкови овощни видове (кайсии, череши, праскови, нектарини и сливи)** Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus),* черничева щитоносна въшка *(Pseudaulacaspis pentagona)*-внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 50-150 мл/дка	П	-	втора професионална	
			1.5 л продукт /дка	**Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, китайска круша – Наши)** Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus)* – внася се във фаза преди BBCH 60 (отворени първи цветове) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 50-150 мл/дка	П	-		