

			30 л/дка	Ягоди Срещу Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) – внася се преди засяване или засаждане на културата Брой мин/макс приложения – 1 Да се прилага в случаи с ниска степен на заплевеляване	П	-		
			60 л/дка	Ягоди Срещу Почвени патогени (<i>Phytophthora sp.</i>) – внася се преди засяване или засаждане на културата Брой мин/макс приложения – 1	О	-		
			60 л/дка	Ягоди Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се преди засяване или засаждане на културата Брой мин/макс приложения – 1	О	-		
			30 л/дка	Ягоди Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се преди засяване или засаждане на културата Брой мин/макс приложения – 1 Да се прилага в случаи с ниска степен на заплевеляване	П	-		
154.	ЛАНСЕЛЮТ Дау АгроСайънсис ЕКСПОРТ САС, Франция Разрешение №01647- ПРЗ-2/13.05.2021 г.	аминопиралид – 300 г/кг флорасулам - 150 г/кг	Продуктът е идентичен на ПРЗ ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО с Разрешение №01287-ПРЗ-4/25.01.2021 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита				втора професионална	

	Заповед № РД 11-2366/22.11.2018 г. Заповед №РД11-899 от 05.05.2021 г.							
155.	ЛАУДИС ОД Байер България ЕООД Разрешение № 0581-ПРЗ -5/07.07.2020 г. Заповед №РД 12-1/09.01.2009 г Заповед РД 11-1252 от 13 октомври 2011 Заповед РД 11-990 от 30.07.2012г. Заповед РД 11-211 от 27.02.2012 г. Заповед №РД 11-1526 от 02.07.2020 г.	44 г/л темботрион + 22 г/л изоксадифен-етил (антидот)	170-225 мл продукт/дка	Царевница, сладка царевница Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	
156.	ЛАУДИС ВГ Байер България ЕООД Разрешение № 01177-ПРЗ-2/07.07.2020 г. Заповед №РД 11-177/18.02.2013 г Заповед №РД 11-1525 от 02.07.2020 г.	200 г/кг темботрион + 100 г/л изоксадифен-етил (антидот)	37,5-50 г продукт/дка + 200 мл/дка адювант	Царевница (зърно, фураж и силаж) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, при височина на балура от семе и коренища 15-25 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Продуктът се използва с адювант Актироб Б или Мерио	П	-	втора професионална	със системно действие
			25 г продукт/дка + 100 мл/дка Адювант	Царевница (зърно, фураж и силаж) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) И от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, при височина на балура от семе и	П	-		

				Внася се след сеитба, преди поникване на културата				
			400-500 мл/дка	Зеле Внася се преди разсаждане Домати (безразсадни) Пипер (безразсадни) - Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури				
68.	ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение №01287-ПРЗ- 5/15.07.2021 г. Заповед №РД 11- 1624/20.08.2018 г. Заповед № РД 11-95 от 12.01.2021 г. Заповед №РД 11-1559 от 07.07.2021 г.	флорасулам -150 г/кг аминопиралид - 300 г/кг	2,5 г/дка	Пролетна пшеница (мека и твърда), пролетен ечемик Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-32 3 листа отворени- вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10 – 40 л/дка Да не се прилага след ВВСН 32	П	-	втора професионална	
			3,3 г/дка	Зимна пшеница (мека и твърда), зимен ечемик Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 21-32 начало на братене: видим първи брат- вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10 – 40 л/дка Да не се прилага след ВВСН 32		-		
			3,3 г продукт /дка	Царевича Срещу широколист ни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтворен втори лист – разтворен шести лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Продуктът се прилага в резервоарна смес с адюванта ДАСОЙЛ 26-2N в доза 50 мл/дка. Продуктът да не се прилага при сладка царевича и царевича за семепроизводство	П	60 дни		

69.	ДЕФЛЕКСО МИКС Асценза Агро С.А., Португалия Разрешение № 01878- ПРЗ-2/15.11.2021 г. Заповед №РД 11-1910 от 19.08.2020 г. Заповед №РД 11-2678 от 10.11.2021 г.	S-метолахлор – 312,5 г/л + тербутилазин – 187,5 - г/л	350 мл продукт /дка	Царевича Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза преди поникване на културата или рано след поникване до разтваряне на 4- лист на културата (до ВВСН 14) Брой мин/макс приложения – едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ Вода л/дка мин/макс – 20 – 40 л/дка	П	-	-	със системно действие
70.	ДЕФЛЕКСО УЛТРА Асценза Агро С.А., Португалия Разрешение № 01955- ПРЗ-2/19.05.2022 г. Заповед №РД 11-1276 от 18.06.2021 г. Заповед №РД 11-895 от 12.05.2022 г.	S-метолахлор - 350 г/л + Сулкотрион - 100 г/л + беноксакор (антидот) - 17.5 г/л	350 мл продукт /дка	Царевича Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване или рано след поникване (до ВВСН 14 – разтваряне на 4 лист на културата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	-	втора професионална	
			210 мл продукт /дка	Минимална употреба Сладка царевича Срещу едногодишни житни и ироколистни плевели – внася се преди поникване или рано след поникване (до ВВСН 14 – разтваряне на 4 лист на културата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	-		
			150 мл продукт /дка	Минимална употреба Сорго Срещу едногодишни житни и ироколистни плевели – внася се преди поникване или рано след поникване (до ВВСН 14 – разтваряне на 4 лист на културата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ ДЕФЛЕКСО УЛТРА за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при сладка царевича и сорго.				