			100 г продукт/ дка 75 г продукт/ дка (първо приложение) 50 г продукт/ дка (второ приложение) 50 г продукт/ дка (трето приложение	**Минимална употреба** **Мак** Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 13-39 на културата Във фаза 1-2 листа на плевелите Брой макс приложения – 2 Интервал между приложенията –10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Или във фаза BBCH 13-39 на културата След поникване на плевелите до фаза 1 лист на плевелите Брой макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ **ЛЕНТАГРАН ВП** за контрол на вредители от Приложение 2. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ **ЛЕНТАГРАН ВП** за контрол на на вредители от Приложение 2 е на лицето, прилагащо продукта.	П	90 дни		
158.	**ЛЕОПАРД 5 ЕК** Адама Агрикалчър Б.В. Нидерландия Разрешение № 01094-ПРЗ- 4/01.09.2020 г. Заповед №РД 11-532/03.05.2012 г. Заповед №РД 11-1890 от 17.08.2020 г.	хизалофоп-Р-етил 50 г/л	100 мл продукт /дка	**Слънчоглед** Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза след поникване BBCH 11-39 (два листа (първа двойка листа) – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие) 3-5 развити листа на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	100 дни	втора професионална	със системно действие

			200 мл продукт /дка	**Слънчоглед** Срещу многогодишни житни плевели – внася се след поникване BBCH 11-39 (два листа (първа двойка листа) – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие) 3-5 развити листа на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	100 дни		
			100 мл продукт /дка	**Захарно цвекло** Срещу едногодишни житни плевели – внася се след поникване BBCH 11-39 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени – листата покриват 90 % от повърхността) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense* Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	60 дни		
			200 мл продукт /дка	**Захарно цвекло** Срещу Многогодишни житни плевели, вкл. балур *(Sorghum halepense)*– внася се след поникване BBCH 11-39 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени – листата покриват 90 % от повърхността) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense* Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	60 дни		
			100 мл продукт /дка	**Картофи** Срещу едногодишни житни плевели – внася се след поникване BBCH 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см) – посева се сгъстява напълно: около 90 % от растенията в редовете се допират) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense* Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	30 дни		

			200 мл продукт /дка	**Картофи** Срещу многогодишни житни плевели, вкл. балур *(Sorghum halepense)* – внася се след поникване BBCH 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см) – посева се сгъстява напълно: около 90 % от растенията в редовете се допират) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense* Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	30 дни		
			100 мл продукт /дка	**Соя** Срещу едногодишни житни плевели – внася се след поникване BBCH 11-39 (разтваря се първата двойка същински листа (единични листа на първия възел - стъблото е достигнало крайната си дължина) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense*	П	60 дни		
			200 мл продукт /дка	**Соя** Срещу многогодишни житни плевели, вкл. балур *(Sorghum halepense)* – внася се след поникване BBCH 11-39 (разтваря се първата двойка същински листа (единични листа на първия възел - стъблото е достигнало крайната си дължина) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense* Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	60 дни		

			100 мл продукт /дка	**Домати** Срещу едногодишни житни плевели – След поникване BBCH 11-70 (първи същински лист на основното стъбло до начало на плододаване) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense* Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			200 мл продукт /дка	**Домати** Срещу многогодишни житни плевели, вкл. балур *(Sorghum halepense)* – внася се след поникване BBCH 11-70 (първи същински лист на основното стъбло до начало на плододаване) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура *Sorghum halepense* Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			120 мл продукт /дка	**Маслодайна рапица** Срещу самосевки от житни култури – внася се във фаза BBCH 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени еждувъзлия) на културата BBCH 13-15 (3 -5 развити листа на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	100 дни		
			100 мл продукт /дка	**Маслодайна рапица** Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза BBCH 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени еждувъзлия) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	100 дни		
			200 мл продукт /дка	**Маслодайна рапица** Срещу многогодишни житни плевели – внася се във фаза BBCH 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени еждувъзлия) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	-		

			100 мл продукт /дка	**Лозя** Срещу едногодишни житни плевели – внася се не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната) 3-5 развити листа на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	45 дни		
			200 мл продукт /дка	**Лозя** Срещу многогодишни житни плевели - – внася се не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната) 3-5 развити листа на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	45 дни		
			100 мл продукт /дка	**Семкови овощни видове** Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер) При поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			200 мл продукт /дка	**Семкови овощни видове** Срещу многогодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер) При поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			100 мл продукт /дка	**Праскови и нектарини** Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – плодовете са достигнали около 90 % от окончателната си големина) При поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1	П	30 дни		

				Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200 мл продукт /дка	**Праскови и нектарини** Срещу многогодишни житни плевели – внася се във фаза BBCH 00-79 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – плодовете са достигнали около 90 % от окончателната си големина) При поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Кайсии, череши, сливи** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза BBCH 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) При поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Цитрусови култури** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза BBCH 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж) При поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		

			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Люцерна, детелина, фий** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза ВВСН 11-39 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П	-		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Бобови култури, сухи (фасул, бакла, грах, нахут, леща)** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се след поникване ВВСН 11-39 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Бобови култури, зелени (фасул, бакла, грах с шушулка)** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се след поникване ВВСН 11-39 (първата двойка листа са разтворени-стъблото е достигнало крайната си дължина) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	42 дни		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Лук, чесън, шалот** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		

			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Моркови, магданоз (корен)** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза BBCH 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Главесто зеле** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза BBCH 11-39 (разтворен първи същински лист – напълно развита листна розетка) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	30 дни		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Памук** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза BBCH 11-39 (първи същински лист разтворен – покриването приключва: 90 % от растенията се срещат между редовете) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П	-		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Лен** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза BBCH 11-39 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П	-		
			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Горска дървесна растителност** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели Внася се във фаза BBCH 11-41 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П	-		

			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Тютюн** Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели плевели,вкл. *Sorghum halepense* Внася се след поникване BBCH 11-39 3-5 развити листа на плевелите	П	40 дни		
159.	**ЛИСТЕГО ПЛЮС** БАСФ ЕООД Разрешение №01607-ПРЗ-1/25.07.2018 г. Заповед №РД 11-1263/12.07.2018 г.	имазамокс - 25 г/л	120-200 мл/дка	**Слънчоглед (Слънчоглед хибриди толерантни на Имидазолинони/имазамокс, вкл. Клиърфийлд и Клиърфийлд Плюс хибриди)** Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка (*Orrobanche spp.*) – внася се във фаза BBCH 12-18 (първа двойка листа до развитие на осем листа) Брой мин/макс приложения – Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка При силно нападение, срещу по- развити или трудно унищожими плевели да се прилага по високата доза 200 мл/дка. Не се разрешава сеитба на рапица и други култури от сем. Кръстоцветни и захарно цвекло 12 месеца след третиране с продукта	-	-	втора професионална	
160.	**ЛИФАЗ 36 СЛ/ ГЛИГОЛД 36 СЛ** Виорил Кемикъл енд Агрикалчърал Индъстри Рисърч С.А., Гърция Разрешение № 01875-ПРЗ-2/10.02.2023 г. Заповед №РД 11-1908 от 19.08.2020 г. Заповед № РД11-90/18.01.2023 г.	глифозат - 360 г/л	150-200 мл продукт/ дка	**Семкови овощни видове (ябълки, круши)** Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите. Брой мин/макс прижения – 1-2 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие	П	7 дни	втора професионална	Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени