

			60-100 г/дка	Минимална употреба Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши Срещу Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			60-100 г/дка	Минимална употреба Лозя Срещу Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	21 дни		
			28-60 г/дка	Минимална употреба Киви, Малини, Касис, Цариградско грозде Срещу Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			60-160 г/дка	Минимална употреба Портокал, Лимон, Мандарина Срещу Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на ЛАМДЕКС ЕКСТРА при употреба срещу неприятеля <i>Drosophila suzukii</i> . Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на продукта срещу <i>Drosophila suzukii</i> при посочените в таблицата култури е на лицето, прилагащо продукта.	П	7 дни		
74.	ЛИМОЦИД Вивагро Технопол Монтескьо, Франция Разрешение № 01834- ПРЗ-1/07.04.2020 г. Заповед № РД 11-767 от 25.03.2020 г.	портокалово масло - 60 г/л	400 мл продукт/дка	Зеле Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден	непрофесионална	Sp8 - Опасен за пчелите При спазване на Закона за пчеларството
			200 мл продукт/дка	Зеле Срещу Белокрылки – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			800 мл продукт/дка	Краставици Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П/О	1 ден		
			400 мл продукт/дка	Краставици Срещу Белокрылки – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	1 ден		
			800 мл продукт/дка	Краставици Срещу Брашнаста мана – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен	П/О	1 ден		

				цвет за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка				
			400 мл продукт/дка	Корнишони Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвет за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П/О	1 ден		
			400 мл продукт/ дка 200 мл продукт/ дка	Домати, Патладжан Срещу Трипси Срещу Белокрылки Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			400 мл продукт/ дка	Леща Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П	1 ден		
			200 мл продукт/дка	Марули, салати Срещу Белокрылка– внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			300 мл продукт/дка	Марули, салати Срещу Брашнеста мана – внася се във фаза ВВСН 12-69 (разтворен втори същински лист – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П/О	1 ден		
			300 мл продукт/дка	Марули, салати Срещу Мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 (разтворен втори същински лист – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П/О	1 ден		
			800 мл продукт/дка	Пъпеш Срещу Трипси - внася се във фаза ВВСН 12-49 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до начало на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П/О	1 ден		
			200 мл продукт/дка	Пъпеш Срещу Белокрылка- внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвет за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			800 мл продукт/дка	Пъпеш Срещу Брашнеста мана ВВСН 12-77 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – растежа продължава до поява на седем плода) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка При пъпеш отглеждани в оранжерии при доза 800 мл/дка се наблюдават	П/О	1 ден		

				симптоми – изгаряне. Повредите не са се отразили значително върху последващото развитие на културата. При спазване Закона за пчеларството				
			320 мл продукт/дка	Лук Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-49 (втори лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали, върхът на луковичката е сух, латентност) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П/О	1 ден		
			200 мл продукт/дка	Пипер Срещу Белокрылка – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			200 мл продукт/дка	Тиквички Срещу Белокрылка – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			400 мл продукт/дка	Тиквички Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-77 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – растежа продължава до поява на седем плода) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			400 мл продукт/дка	Ягоди Срещу Трипси– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит – втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П/О	1 ден		
			300 мл продукт/дка	Ягоди Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит – втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П/О	1 ден		
			200 мл продукт/дка	Билки: невен, кантарион, мента, шипка, маточина, лавандула, маслодайна роза; подправки: анасон, босилек, копър, резене Срещу Трипси– внася се във фаза ВВСН 12-49 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка	П/О	-		
			400 мл продукт/дка	Декоративни растения Срещу Белокрылка внася се във фаза ВВСН 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	-		
			640 мл продукт/дка	Декоративни растения Срещу Трипси внася се във фаза ВВСН 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	-		
			800 мл продукт/дка	Декоративни дървета Липа Срещу Ларви на <i>Metcalfa pruinosa</i> - внася се във фаза ВВСН 12-49 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	-		
			640 мл продукт/дка	Декоративни дървета Липа Срещу Трипси - внася се във фаза ВВСН 12-49 Брой мин/макс приложения – 6	П	-		

				Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка				
			600 мл продукт/дка	Декоративни дървета Липа Срещу Брашнеста мана- внася се във фаза ВВСН 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	-		
			800 мл продукт/дка	Рози Срещу Трипси - внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П/О	-		
			400 мл продукт/дка	Рози Срещу Белокрылка- внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	-		
			600 мл продукт/дка	Рози Срещу Брашнеста мана- внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	-		
			200 мл продукт/дка	Лозя Срещу Акари - внася се във фаза ВВСН 40-89 (преди поява на съцветия – плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка При лозя се наблюдават фитотксични симптоми при съвместна употреба на продукта в доза 480 мл/дка с продукти съдържащи сяра	П	1 ден		
			160 мл продукт/дка	Лозя Срещу Ларви на <i>Empoasca vitis</i> - внася се във фаза ВВСН 40-89 (преди поява на съцветия – плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка	П	1 ден		
			160 мл продукт/дка	Лозя Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 (вторите листа са отворени – плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка	П	1 ден		
			160 мл продукт/дка	Лозя Срещу Брашнеста мана и Мана– внася се във фаза ВВСН 12-77 (вторите листа са отворени – зърната започват да се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка При лозя се наблюдават фитотксични симптоми при съвместна употреба на продукта в доза 480 мл/дка с продукти съдържащи сяра.	П	1 ден		
			280 мл продукт/дка	Ябълки и круши Срещу Бълхи– внася се във фаза ВВСН 12-89 (разлистване на листата – консумативна зрелост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-70 л/дка При круши се отчитат изгаряния по листата при наличие на медена роса отделена от <i>Psylla pyri</i> причинено от високите летни температури	П	1 ден		
			400 мл продукт/дка	Ябълки и круши Срещу Ларви на <i>Metcalfa pruinosa</i> – внася се във фаза ВВСН 40-89(край на образуването на летораста – консумативна зрелост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни	П	1 ден		

				Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка				
	280 мл продукт/дка	Ябълки и круши Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 (разлистване на листата – край на цъфтежа – всички венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-70 л/дка		П		1 ден		
	200 мл продукт/дка	Малини, касис и къпини Срещу Акари– внася се във фаза ВВСН 40-89 (край на растежа на леторастите: при малини – прибрана е почти цялата продукция, при касис - плодчетата в основата на грозда капят лесно) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка		П		1 ден		
	240 мл продукт/дка	Малини, касис и къпини Срещу Ларви на <i>Metcalfa pruinosa</i> – внася се във фаза ВВСН 40-89 (край на растежа на леторастите: при малини – прибрана е почти цялата продукция, при касис - плодчетата в основата на грозда капят лесно) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10 - 30 л/дка		П		1 ден		
	240 мл продукт/дка	Малини, касис и къпини Срещу Брашнеста мана – внася се във фаза ВВСН 12-77 (разтворен втори лист – 70 % от плодовете са видими) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10 - 30 л/дка		П		1 ден		
	240 мл продукт/дка	Моркови Срещу Брашнеста мана – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10 - 40 л/дка		П/О		1 ден		
	300 мл продукт/дка	Цикория Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка		П/О		1 ден		
	300 мл продукт/дка	Тинтява Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка		П/О		1 ден		
	180 мл продукт/дка	Магданоз Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка		П/О		1 ден		
	320 мл продукт/дка	Репички Срещу Мана (<i>Peronospora brassicae</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-49 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 80 л/дка При репички се отчитат изгаряния по котиledonите при употреба в доза 1 и 0.67 %, но не и в заявената доза от 0.4 %.		П/О		1 ден		
	300 мл продукт/дка	Естрагон Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка		П/О		1 ден		
	1000 мл продукт/дка	Хризантеми Срещу Бяла ръжда– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6		О		1 ден		

				Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50 - 100 л/дка				
			600 мл продукт/дка	Хмел Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 40-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50 - 100 л/дка	П	1 ден		
75.	КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС Синджента България ЕООД Разрешение № 01017-4/ 10.05.2016 г. Заповед № РД 09-790/28.12.2002 г., Заповед № РД 09-664/9.12.2004 г., <u>Заповед № РД 12-62/29.12.2006 г.</u> <u>Заповед № РД 12-27/05.03.2010 г.</u> Заповед № РД 11-1656/29.12.2011 г. Заповед № РД 11-704/22.04.2016 г. Заповед № РД 11-27/03.01.2020 г.	<u>ламбда цихалотрин</u> - 50 г/л	0,02 %	Лозя Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14	П	10 дни	втора професионална	
			15 мл/дка	Люцерна Срещу люцернов листояд (<i>Phytodecta fornicata</i>)	П	30 дни		
			15 мл продукт /дка	Ечемик Вредна житна дървеница (ларви) (<i>Eurygaster integriceps</i>) Обикновена житна пиявица (<i>Oulema melanopa</i>) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията - 14	П	28 дни		
			15 мл/дка	Пшеница Вредна житна дървеница (ларви) (<i>Eurygaster integriceps</i>) обикновена житна пиявица (<i>Oulema melanopa</i>) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 14	П	28 дни		
			15 мл/дка	Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията - 10	П	14 дни		
			15 мл/дка	Главесто зеле Зелева ношенка (<i>Mamestra brassicae</i>) Брой мин/макс приложения – 1	П	7 дни		
			15 мл/дка	Рапица Рапичен цветояд <i>Meligethes aeneus</i> Рапична листна оса (<i>Athalia rosae</i> , <i>Athalia colibri</i>) - ВВСН 10-18 напълно оформени котелидони – растежа продължава до осми лист Брой мин/макс приложения - 1	П	30 дни		
			15 мл/дка		П	60 дни		
			15 мл/дка	Тютюн Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>) зелена прасковена листна въшка (<i>Myzodes persicae</i>)				
			15 мл/дка	Череши Черешова муха <i>Rhagoletis cerasi</i> – внася се във фаза ВВСН 79-85 плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина – оцветяването се развива Брой мин/макс приложения - 1	П	7 дни		
			15 мл/дка	Минимална употреба Череши Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i> – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС при минимална употреба.				