

			80-100 г/дка	Минимална употреба Ябълки Круши Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) Първо поколение – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			80-100 г/дка	Минимална употреба Ябълки Круши Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) Второ поколение – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			60-100 г/дка	Минимална употреба Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			60-100 г/дка	Минимална употреба Лозя Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			28-60 г/дка	Минимална употреба Киви Малини Касис Цариградско грозде Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П	7 дни		
			60-160 г/дка	Минимална употреба Портокал Лимон Мандарина Срещу Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>) – внася се при поява Брой мин/макс приложения – Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на ЛАМДЕКС ЕКСТРА при употреба срещу неприятеля <i>Drosophila suzukii</i> . Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на продукта срещу <i>Drosophila suzukii</i> при посочените в таблицата култури е на лицето, прилагащо продукта.	П	7 дни		
75.	ЛИМОЦИД Вивагро Технопол Монтескьо, Франция Разрешение № 01834- ПРЗ-1/07.04.2020 г. Заповед № РД 11-767 от 25.03.2020 г.	портокалово масло - 60 г/л	400 мл продукт/дка	Зеле Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден	непрофесионална	Spe8 - Опасен за пчелите При спазване на Закона за пчеларството
			200 мл продукт/дка	Зеле Срещу Белокрилки – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О	1 ден		
			800 мл продукт/дка	Краставици Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори	П/О	1 ден		

				същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост; плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка				
			400 мл продукт/дка	Краставици Срещу Белокрылки– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост; плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О		1 ден	
			800 мл продукт/дка	Краставици Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост; плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О		1 ден	
			400 мл продукт/дка	Корнишони Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост; плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П/О		1 ден	
			400 мл продукт/ дка 200 мл продукт/ дка	Домати, Патладжан Срещу Трипси Срещу Белокрылки Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О		1 ден	
			400 мл продукт/ дка	Леща Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П		1 ден	
			200 мл продукт/дка	Марули, салати Срещу Белокрылка– внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О		1 ден	
			300 мл продукт/дка	Марули, салати Срещу Брашнеста мана – внася се във фаза ВВСН 12-69 (разтворен втори същински лист – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П/О		1 ден	
			300 мл продукт/дка	Марули, салати Срещу Мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 (разтворен втори същински лист – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П/О		1 ден	
			800 мл продукт/дка	Пъпеши Срещу Трипси - внася се във фаза ВВСН 12-49 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до начало на цъфтеж)	П/О		1 ден	

				Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка				
		200 мл продукт/дка	Пъпеш Срещу Белокрылка- внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О		1 ден		
		800 мл продукт/дка	Пъпеш Срещу Брашнеста мана ВВСН 12-77 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – растежа продължава до поява на седем плода) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка При пъпеш отглеждани в оранжерии при доза 800 мл/дка се наблюдават симптоми – изгаряне. Повредите не са се отразили значително върху последващото развитие на културата. При спазване Закона за пчеларството	П/О		1 ден		
		320 мл продукт/дка	Лук Срещу Трипси – внася се във фаза ВВСН 12-49 (втори лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали, върхът на луковичката е сух, латентност) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П/О		1 ден		
		200 мл продукт/дка	Пипер Срещу Белокрылка – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О		1 ден		
		200 мл продукт/дка	Тиквички Срещу Белокрылка – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О		1 ден		
		400 мл продукт/дка	Тиквички Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-77 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – растежа продължава до поява на седем плода) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка	П/О		1 ден		
		400 мл продукт/дка	Ягоди Срещу Трипси– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит – втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П/О		1 ден		
		300 мл продукт/дка	Ягоди Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит – втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка	П/О		1 ден		
		200 мл продукт/дка	Билки: невен, кантарион, мента, шипка, маточина, лавандула, маслодайна роза; подправки: анасон, босилек, копър, резене	П/О		-		

				Срещу Трипси– внася се във фаза BVCH 12-49 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка				
		400 мл продукт/дка	Декоративни растения Срещу Белокрылка внася се във фаза BVCH 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О		-		
		640 мл продукт/дка	Декоративни растения Срещу Трипси внася се във фаза BVCH 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О		-		
		800 мл продукт/дка	Декоративни дървета Липа Срещу Ларви на <i>Metcalfa pruinosa</i> - внася се във фаза BVCH 12-49 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П		-		
		640 мл продукт/дка	Декоративни дървета Липа Срещу Трипси - внася се във фаза BVCH 12-49 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка	П		-		
		600 мл продукт/дка	Декоративни дървета Липа Срещу Брашнеста мана- внася се във фаза BVCH 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П		-		
		800 мл продукт/дка	Рози Срещу Трипси - внася се във фаза BVCH 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П/О		-		
		400 мл продукт/дка	Рози Срещу Белокрылка- внася се във фаза BVCH 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О		-		
		600 мл продукт/дка	Рози Срещу Брашнеста мана- внася се във фаза BVCH 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О		-		
		200 мл продукт/дка	Лозя Срещу Акари - внася се във фаза BVCH 40-89 (преди поява на съцветия – плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка При лозя се наблюдават фитотоксични симптоми при съвместна употреба на продукта в доза 480 мл/дка с продукти съдържащи сяра	П		1 ден		
		160 мл продукт/дка	Лозя Срещу Ларви на <i>Empoasca vitis</i> - внася се във фаза BVCH 40-89 (преди поява на съцветия – плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка	П		1 ден		
		160 мл продукт/дка	Лозя Срещу Трипси – внася се във фаза BVCH 12-89 (вторите листа са отворени – плодът е готов за беритба)	П		1 ден		

				Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка				
		160 мл продукт/дка	Лозя Срещу Брашнеста мана и Мана– внася се във фаза ВВСН 12-77 (вторите листа са отворени – зърната започват да се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка При лозя се наблюдават фитотоксични симптоми при съвместна употреба на продукта в доза 480 мл/дка с продукти съдържащи сяра.	П		1 ден		
		280 мл продукт/дка	Ябълки и круши Срещу Бълхи– внася се във фаза ВВСН 12-89 (разлистване на листата – консумативна зрелост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-70 л/дка При круши се отчитат изгаряния по листата при наличие на медена роса отделена от <i>Psylla pyri</i> причинено от високите летни температури	П		1 ден		
		400 мл продукт/дка	Ябълки и круши Срещу Ларви на <i>Metcalfa pruinosa</i> – внася се във фаза ВВСН 40-89(край на образуването на леторасти – консумативна зрелост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П		1 ден		
		280 мл продукт/дка	Ябълки и круши Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 (разлистване на листата – край на цъфтежа – всички венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-70 л/дка	П		1 ден		
		200 мл продукт/дка	Малини, касис и къпини Срещу Акари– внася се във фаза ВВСН 40-89 (край на растежа на леторастите: при малини – прибрана е почти цялата продукция, при касис - плодчетата в основата на грозда капят лесно) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка	П		1 ден		
		240 мл продукт/дка	Малини, касис и къпини Срещу Ларви на <i>Metcalfa pruinosa</i> – внася се във фаза ВВСН 40-89 (край на растежа на леторастите: при малини – прибрана е почти цялата продукция, при касис - плодчетата в основата на грозда капят лесно) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10 - 30 л/дка	П		1 ден		
		240 мл продукт/дка	Малини, касис и къпини Срещу Брашнеста мана – внася се във фаза ВВСН 12-77 (разтворен втори лист – 70 % от плодовете са видими) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10 - 30 л/дка	П		1 ден		
		240 мл продукт/дка	Моркови Срещу Брашнеста мана – внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят) Брой мин/макс приложения – 6	П/О		1 ден		

				Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 10 - 40 л/дка				
			300 мл продукт/дка	Цикория Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка	П/О	1 ден		
			300 мл продукт/дка	Тинтява Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка	П/О	1 ден		
			180 мл продукт/дка	Магданоз Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка	П/О	1 ден		
			320 мл продукт/дка	Репички Срещу Мана (<i>Peronospora brassicae</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-49 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 80 л/дка При репички се отчитат изгаряния по котиленоните при употреба в доза 1 и 0.67 %, но не и в заявената доза от 0.4 %.	П/О	1 ден		
			300 мл продукт/дка	Естрагон Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30 - 50 л/дка	П/О	1 ден		
			1000 мл продукт/дка	Хризантеми Срещу Бяла ръжда– внася се във фаза ВВСН 12-69 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50 - 100 л/дка	О	1 ден		
			600 мл продукт/дка	Хмел Срещу Брашнеста мана– внася се във фаза ВВСН 40-89 Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50 - 100 л/дка	П	1 ден		
76.	КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС Синджента България ЕООД Разрешение № 01017-4/ 10.05.2016 г. Заповед № РД 09- 790/28.12.2002 г., Заповед № РД 09- 664/9.12.2004 г., <u>Заповед № РД 12- 62/29.12.2006 г.</u> <u>Заповед № РД 12- 27/05.03.2010 г</u> Заповед № РД 11- 1656/29.12.2011 г. Заповед №РД 11- 704/22.04.2016 г. Заповед № РД 11- 27/03.01.2020 г.	ламбда цихалотрин - 50 г/л	0,02 %	Лозя Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14	П	10 дни	втора професионална	
			15 мл/дка	Люцерна Срещу люцернов листояд (<i>Phytodecta fornicata</i>)	П	30 дни		
			15 мл продукт /дка	Ечемик Вредна житна дървеница (ларви) (<i>Eurygaster integriceps</i>) Обикновена житна пиявица (<i>Ouleta melanopa</i>) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията - 14	П	28 дни		
			15 мл/дка	Пшеница Вредна житна дървеница (ларви) (<i>Eurygaster integriceps</i>) обикновена житна пиявица (<i>Ouleta melanopa</i>) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - 14	П	28 дни		
			15	Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	П	14 дни		