

			100 мл продукт /дка 200 мл продукт /дка	Минимална употреба Тютюн Срещу едногодишни житни плевели Срещу многогодишни житни плевели плевели,вкл. <i>Sorghum halepense</i> Внася се след поникване ВВСН 11-39 3-5 развити листа на плевелите	П	40 дни		
159	ЛИСТЕГО ПЛЮС БАСФ ЕООД Разрешение №01607- ПРЗ-1/25.07.2018 г. Заповед №РД 11- 1263/12.07.2018 г.	имазамокс - 25 г/л	120-200 мл/дка	Слънчоглед (Слънчоглед хибриди толерантни на Имидазолинони/имазамокс, вкл. Клиърфийлд и Клиърфийлд Плюс хибриди) Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка (<i>Orrobanche spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-18 (първа двойка листа до развитие на осем листа) Брой мин/макс приложения – Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка При силно нападение, срещу по- развити или трудно унищожими плевели да се прилага по високата доза 200 мл/дка. Не се разрешава сеитба на рапица и други култури от сем. Кръстоцветни и захарно цвекло 12 месеца след третиране с продукта	-	-	втора професионална	
160	ЛИФАЗ 36 СЛ/ ГЛИГОЛД 36 СЛ Виорил Кемикал енд Агрикалчърал Индъстри Рисърч С.А., Гърция Разрешение № 01875- ПРЗ-2/10.02.2023 г. Заповед №РД 11-1908 от 19.08.2020 г. Заповед № РД11- 90/18.01.2023 г.	глифозат - 360 г/л	150-200 мл продукт/ дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след поникване – по време на най- интензивния растеж на плевелите. Брой мин/макс приложения – 1-2 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие	П	7 дни	втора професионална	Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени