

	Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 02040-ПРЗ- 1/18.10.2022 г. Заповед №РД11- 2148/30.09.2022		мл продукт /100 кг семена (0.675 мл продукт/дка при сеитбена норма 7200 семена/дка)	внося се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1			
154.	ЛУНА ЕКСПИРИАНС Байер България ЕООД Удостоверение № 1195- ПРЗ/02.12.2013 г. Заповед № РД 11- 1172/05.11.2013 г Заповед № РД 11- 1241/19.11.2013 г.	200 г/л тебуконазол + 200 г/л флуопирам	12-40 мл/дка (0.120-0.400 л/ха) 0.200- 0.750 л/ха (20-75 мл/дка)	Винени сортове лозя Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) Ябълки и круши: Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), Брашнеста мана по ябълка (<i>Podosphaera leucotricha</i>), Стемфилиум (<i>Stemphiliium vesicarium</i>), Алтернария (<i>Alternaria sp.</i>), Антракноза (<i>Glomerella cingulata</i>), Меко пеницилийно гниене (<i>Penicilium</i> <i>sp.</i>), Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), глейоспорийно гниене (<i>Pezicula alba</i>) Кайсия, праскова, нектарина, череша Брашнеста мана (<i>Sphaeroteca pannosa</i>) Кайсия, праскова, нектарина, череша Ранно и късно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia fructicola</i>) Аспержи Ръжда (<i>Puccinia asparagi</i>) и стемфилиум (<i>Stemfilium vesicatoria</i>) Лук и чесън Ръжда (<i>Puccinia allii</i>) и кафяви петна (<i>Pleospora allii</i>)	лозя -винени сортове- 14 дни; ябълки, круши-14 дни; кайсии, праскови, нектарини череша- 3-7 дни; лук, чесън- 7 дни; аспержи: не е приложим	1	
155.	ЛУНА СЕНСЕЙШЪН Байер България ЕООД Разрешение №01559-ПРЗ- 1/12.03.2018 г. Заповед № РД 11- 360/28.02.2018 г. Заповед №РД 11-25 от	Флуопирам - 250 г/л Трифлуксистриби н 250 г/л	60-80 мл/дка	Ягоди Срещу Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Брашнеста мана (<i>Podosphaeraaaphanis</i>)- внася се във фаза ВВСН 40-89 (поява на столони- втора реколта: повечето плодове са оцветени)	1 ден	втора професионална	

	03.01.2020 г.			Брой мин/макс приложения 1-2 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 60 – 80 мл/дка			
			60-80 мл/дка	Марули Срещу Склеротиния (<i>Sclerotinia</i> spp.) - внося се във фаза ВВСН 40-49 (листна розетка напълно формирана- формирана цялата листна маса) Брой мин/макс приложения 1 Вода л/дка мин/макс – 60 – 80 мл/дка		7 дни	
			60 мл продукт/ дка	Пипер, вкл. лют пипер и чили Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) – внося се във фаза ВВСН 51-89 (от начало на цъфтеж- до пълна зрялост) Брой мин/макс приложения 2 Интервал между приложенията – 10- 14 Вода л/дка мин/макс – 50 – 150 мл/дка		3 дни	
156.	ЛУНА КЕЪР Байер България ЕООД Разрешение № 01733-ПРЗ-1/07.08.2019 г. Заповед РД 11-520/31.07.2019 г.	фосетил- алуминий - 666 г/кг флуопирам - 50 г/кг	До 300 г/дка за едно приложение	Ябълки Срещу Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>) Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>) Нектриален рак (<i>Nectria galligena</i>) – внося се във фаза ВВСН 71-81 (размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка 100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дка	П	28 дни	втора професионална
			До 300 г/дка за едно приложение	Круши Дюли Азиатски круши - наши Срещу Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i> , Бактериоза (<i>Pseudomonas syringae</i>)	П	28 дни	