

			0,630- 0.750 л/ ха (63-75 мл/дка)	Кайсия, праскова, нектарина, череша Ранно и късно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia fructicola</i>)			
			0.750 л/ха (75 мл/дка)	Аспержи Ръжда (<i>Puccinia asparagi</i>) и стемфилиум (<i>Stemfilium vesicatoria</i>)			
			0.600- 1.0 л/ха (60 - 100 мл/дка)	Лук и чесън Ръжда (<i>Puccinia allii</i>) и кафяви петна (<i>Pleospora allii</i>)			
153.	ЛУНА СЕНСЕЙШЪН Байер България ЕООД Разрешение №01559-ПРЗ- 1/12.03.2018 г. Заповед № РД 11- 360/28.02.2018 г. Заповед №РД 11-25 от 03.01.2020 г.	Флуопирам - 250 г/л Трифлуксистриби н 250 г/л	60-80 мл/дка	Ягоди Срещу Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Брашнеста мана (<i>Podosphaeraaaphanis</i>)- внася се във фаза ВВСН 40-89 (поява на столони- втора реколта: повечето плодове са оцветени) Брой мин/макс приложения 1-2 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 60 – 80 мл/дка		1 ден	втора професионална
			60-80 мл/дка	Марули Срещу Склеротиния (<i>Sclerotinia spp.</i>) - внася се във фаза ВВСН 40-49 (листна розетка напълно формирана- формирана цялата листна маса) Брой мин/макс приложения 1 Вода л/дка мин/макс – 60 – 80 мл/дка		7 дни	
			60 мл продукт/ дка	Пипер, вкл. лют пипер и чили Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-89 (от начало на цъфтеж- до пълна зрялост) Брой мин/макс приложения 2 Интервал между приложенията – 10- 14 Вода л/дка мин/макс – 50 – 150 мл/дка	О	3 дни	

154.	ЛУНА КЕЪР Байер България ЕООД Разрешение № 01733-ПРЗ-1/07.08.2019 г. Заповед РД 11-520/31.07.2019 г.	фосетил- алуминий - 666 г/кг флуопирам - 50 г/кг	До 300 г/дка за едно приложение	Ябълки Срещу Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>) Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>) Нектриален рак (<i>Nectria galligena</i>) – внося се във фаза ВВСН 71-81 (размер на завръза до 10 мм; следсъфтежно окапване – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка 100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дка	П	28 дни	втора професионална
			До 300 г/дка за едно приложение	Круши Дюли Азиатски круши - наши Срещу Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>), Бактериоза (<i>Pseudomonas syringae</i>) Нектриален рак (<i>Nectria galligena</i>), Стемфилиум (<i>Stemphylium</i> spp.) Струпясване (<i>Venturia pyrina</i>) Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>) – внося се във фаза ВВСН 51-81 (набъбване на неразцъфналите пъпки: удължаване на люспите, пъпките са удължени със светло оцветени участъци - начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка 100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дка	П	28 дни	