

155.	МАГМА ТРИПЪЛ ВГ Индустриас Афраз С.А., Испания Разрешение № 01935-ПРЗ- 1/31.03.2021 г. Заповед № РД 11- 613/25.03.2021 г.	фосетил- алуминий - 500 г/кг + фолпет – 250 г/кг + цимоксанил – 40 г/кг	300 г/дка	Лозя (десертни и винени сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внося се във фаза ВВСН 61-75 (начало на цъфтеж: 10% опадане на ресите – гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата започват да увисват) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10- 14 дни Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка Да не се консумират листа от третира- ните лози Забележка: Употребата на други продукти за растителна защита, съдържащи активните вещества калиеви фосфонати, динатриев фосфонат или други активни вещества, които водят до наличие на фосфонова киселина, да се ограничи до общо 10 кг еквивалент на фосфонова киселина/хектар за година	П	28 дни	втора професионална	със системно и несистемно действие
156.	МАГНЕЛО ЕК Синджента България ЕООД Разрешение № 01271–ПРЗ- 1/24.01.2020 г. Заповед № РД 11- 1766/10.11.2014 г. Заповед №РД 11-270 от 24.01.2020 г.	дифеноконазол - 100 г/л тебуконазол - 250 г/л	100 мл/дка	Пшеница Фузариоза (<i>Fusarium spp.</i>) Септориоза по класа/листни петна (<i>Septoria tritici</i>), Петносване по класа (<i>Stagonospora</i> <i>podogum</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia</i> <i>recognita</i>) Момент на приложение ВВСН 51 – 69 Начало на изкласяване - край на цъфтежа, брой приложения: 1, листно третиране		-	втора професионална	
157.	МАНАМИД 100 СК МАНИКА С.п.А., Италианска република Разрешение № 01934-ПРЗ- 1/31.03.2021 г. Заповед №РД11- 612/25.03.2021 г.	циазофамид – 100 г/л	90–110 мл/дка	Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внося се във фаза ВВСН 11 – 85 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста –омекване на зърната) Брой ми/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 8-10 дни за доза 90 мл/дка или 12-14 дни за доза 110 мл/дка	П	21 дни	втора професионална	