			25 пелети/м^3 (=5 г PH_3/m^3)	**Тютюн при съхранение** Срещу Житна гърлица (*Sitophilus granarius*), оризова гърлица (*Sitophilus oryzae*), фасулев зърнояд (*Acanthoscelides obtectus*), грахов зърнояд (*Bruchus pisorum*) царевична гърлица (*Sitophilus zeamais*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*), малък брашнен бръмбар (*Tribolium confusum*), зърнов бръмбар (ризоперта) (*Rhyzopertha dominica*), ръждивочервен зърнов бръмбар (*Cryptolestes ferrugineus*), трогодерма (*Trogoderma granarium*), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*),молец по сушените плодове (*Plodia interpunctella*), сив брашнен молец (*Ephestia kuehniella*), тютюнев бръмбар (*Lasioderma serricorne*), тютюнев молец (*Ephestia elutella*),ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), трогодерма (*Trogoderma glabrum*),брашнени бръмбари(*Tenebriosp.)*, брашнян акар (*Acarus siro*), хлебен бръмбар (*Stegobium paniceum*) и *Tyroglyphus sp.* Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 3-5 дневна експозиция
			25 пелети/м^3 (=5 г PH_3/m^3)	**Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи** Срещу Житна гърлица (*Sitophilus granarius*), оризова гърлица (*Sitophilus oryzae*), фасулев зърнояд (*Acanthoscelides obtectus*), грахов зърнояд (*Bruchus pisorum*) царевична гърлица (*Sitophilus zeamais*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*), малък брашнен бръмбар (*Tribolium confusum*), зърнов бръмбар (ризоперта) (*Rhyzopertha dominica*), ръждивочервен зърнов бръмбар (*Cryptolestes ferrugineus*), трогодерма (*Trogoderma granarium*), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*),молец по сушените плодове (*Plodia interpunctella*), сив брашнен молец (*Ephestia kuehniella*), тютюнев бръмбар (*Lasioderma serricorne*), тютюнев молец (*Ephestia elutella*),ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), трогодерма (*Trogoderma glabrum*),брашнени бръмбари(*Tenebriosp.)*, брашнян акар (*Acarus siro*), хлебен бръмбар (*Stegobium paniceum*) и *Tyroglyphus sp.* Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 3-5 дневна експозиция
92.	**МАДЕКС ТВИН** Андерматт Биогартен ГмбХ, Германия Разрешение№ 01327-3/17.05.2023 г. Заповед №РД 11-1103/24.06.2015 г. Заповед №РД 11-1008 от 18.05.2020 г Заповед № РД 11-1620/15.07.2022 г. Заповед № РД11-1016/04.05.2023 г.	Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 (DSMZ - № GV-0014) – 3 x 10^{13} гранули/литър	10 мл/дка	**Ябълки, круши, орехи** Ябълков плодов червей (*Cydiapomonella)* – първо третиране – при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете Брой мин/макс приложения - Макс. 9/ вегетационен период Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка	П	1 ден	непрофесионална	Да се пръска привечер
			10 мл/дка	**Праскови, сливи, бадем** Източен плодов червей – (*Grapholita molesta)* - първо третиране –при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете Брой мин/макс приложения - Макс.12/ вегетационен период Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка				
93.	**МАДЕКС ТОП** Андерматт Биогартен ГмбХ, Германия Разрешение № 01309-ПРЗ-3/17.05.2023 г. Заповед № РД 11-410/10.03.2015 г. Заповед №РД 11-1010 от 18.05.2020 г. Заповед № РД 11-1618/15.07.2022 г.	Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15 (DSMZ - № GV-0013) – 3 x 10^{13} гранули/литър	10 мл/дка	**Ябълки, круши, наши (китайска круша), дюли, орехи** Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*) - първо третиране – при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете Брой мин/макс приложения - макс.10 /вегетационен период Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден Вода л/дка мин/макс – 40 – 120 л/дка	П	1 ден	непрофесионална	Да се пръска привечер

	Заповед № РД11-1018/04.05.2023 г.							
94.	**МАСАН** СБМ ДЕВЕЛОПМЪНТ, Франция Разрешение № 01995-ПРЗ-1/21.12.2021 г. Заповед №РД 11-3076 от 16.12.2021 г.	Циперметрин – 100 г/л + пиперонил бутоксид (синергист) – 300 г/л	25 мл/дка	**Зимна маслодайна рапица, Пролетна рапица** Срещу Рапична стъблена бълха (*Psylliodes chrysocephala*) срещу възрастни ВВСН 09-19 (поникване - 9 или повече листа оформени) Ларви ВВСН 15-30 (разтворен пети лист-начало на нарастване на стъблото)	П	28 дни	втора професионална	с несистемно действие **1) SPe8 – Опасен за пчелите** Да не се прилага по време на цъфтеж на културите (ВВСН 60-69) и плевелите 2) Не повече от 2 приложения на вегетационен период за културата
				Рапичен цветояд (*Meligethes* spp.) – внася се във фаза ВВСН 51 (отгоре видими цветните пъпки („зелен бутон”)				
				Зелеви листни въшки (*Brevicoryne brassicae*) – внася се във фаза ВВСН 39-50 (9 или повече оформени междувъзлия – наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка				
			25 мл/дка	**Картофи** Срещу Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*) – внася се при нападение над ПИВ Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс 50-100 л/дка	П	14 дни		
95.	**МЕТЕОР** Диакем С.п.А., Италия Разрешение № 01361 – ПРЗ-2/20.12.2017 г. Заповед №РД 11-1842/09.12.2015 г. Заповед №РД 11-2611/01.12.2017 г. Заповед №РД11-47 от 06.01.2020 г.	делтаметрин – 15,7 г/л	70-90 мл/100 л.вода	**Цитрусови култури** Листни въшки (сем.*Aphididae*), щитоносни въшки (сем. *Diaspididae*), белокрилки (*Aleurodidae*), средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*) – внася се При поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	П	Цитрусови култури -3 дни; Кайсии, праскови, череши, сливи – 3 дни; Ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи, бадеми, лозя, маслини, – 3 дни; Чесън, аспержи, артишок, главесто зеле,цветно зеле, броколи, китайско зеле, брюкселско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, моркови, краставици, фасул, зелен фасул бакла, ягоди (в оранжерии на открито), салата, патладжан,пъпеши, грах, праз, домати (в оранжерии и на открито), пипер, рукола, спанак, тиквички тикви -3 дни; лук, целина, праз, картофи - 7 дни; Пшеница, ечемик и царевица – 3 дни;	непрофесионална	**SPe8-**Опасен за пчелите.
			60-90 мл/100 л. Вода 90 мл/100 л.вода	**Кайсии, праскови, череши, сливи** Aromia bungii Aromia bungii За локална употреба върху стъблото Внася се при поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка				
			90 мл/100 л.вода	**Ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи, бадеми** Ларви на калифорнийска щитоносна въшка – лятно приложение (*Quadraspidiotus perniciosus*), крушова листна бълха (*Psylla pyri*), източен плодов червей (*Cydia molesta*) , прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*)				
			60 мл/100 л. Вода 60-90 мл/ 100 л. вода 70-90 мл/100 л. вода	**Ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи, бадеми** Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella* Плодова корогризачка **(***Adoxophyes orana*), миниращи молци по ябълки и круши (*Leucoptera* spp.), хоботници (*Rhynchites* spp.), листороги бръмбари (сем. Scarabeidae), ябълкова плодова оса (*Hoplocampa testudine*a Зелена ябълкова листна въшка (*Aphis pomi*), прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*), трипси (сем.*Thripidae*) Внася се при поява/ и /или при достигане на приетите прагове на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка				
			70 - 90 мл/100 л. вода	**Лозя** Цикади (сем. *Cicadellidae*), листни въшки (сем.*Aphididae*), листозавивачки, гроздови молци (сем. *Tortricidae*), нощенки (сем.*Noctuidae*), царевичен				